

*Partie I - Variables aléatoires entières décomposables***I.A - Premiers exemples**

On notera  $R_X$  le rayon de la série entière de somme  $G_X$ .

**I.A - 1)** Si  $X \sim X'$ , alors  $G_X = G_{X'}$ . Réciproquement, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 \leq \mathbb{P}(X = n) \leq 1$  et donc  $R_X \geq 1$ . On sait alors que

$$G_X = G_{X'} \Rightarrow \forall t \in ]-1, 1[, G_X(t) = G_{X'}(t) \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(X' = n) \Rightarrow X \sim X'.$$

**I.A - 2)** On sait que pour  $t \in ]-R_X, R_X[$ ,  $G_X(t) = E(t^X)$ .  $Y$  et  $Z$  sont indépendantes et donc  $t^Y$  et  $t^Z$  le sont. Par suite, pour tout  $t$  dans  $]-\min\{R_Y, R_Z\}, \min\{R_Y, R_Z\}[$  (au moins)

$$G_X(t) = E(t^X) = E(t^Y t^Z) = E(t^Y) E(t^Z) = G_Y(t) G_Z(t).$$

**I.A - 3)** Si  $n \geq 2$ , on sait que  $X$  est la somme de  $n$  variables de Bernoulli indépendantes  $X_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ , de mêmes lois  $\mathcal{B}(1, p)$  et en particulier est la somme des deux variables indépendantes  $X_1 + \dots + X_{n-1}$  et  $X_n$ , ces deux variables n'étant pas constantes presque sûrement (car  $n-1 \geq 1$  et  $p \in ]0, 1[$ ). Dans ce cas,  $X$  est décomposable.

Si  $n = 1$  et si  $X = Y + Z$ , l'événement  $X = 0$  est l'événement  $(Y, Z) = (0, 0)$  et l'événement  $X = 1$  est l'événement  $(Y, Z) = (1, 0)$  ou  $(Y, Z) = (0, 1)$ . Ceci impose que l'un des deux événements  $Y = 0$  ou  $Z = 0$  soit l'événement certain et donc  $X$  n'est pas décomposable.

**I.A - 4) a)** Pour tout  $t \geq 0$ ,  $A(t) > 0$ .  $A$  n'a donc pas de racine qui est un réel positif. Par suite, on ne peut avoir  $\deg(U) = 1$  (resp.  $\deg(V) = 1$ ) car alors les deux coefficients de  $U$  (resp.  $V$ ) sont non nuls de signes contraires. Si  $U$  et  $V$  ne sont pas constants, il ne reste plus que la possibilité  $\deg(U) = \deg(V) = 2$ .

$A' = 4T^3 + 2$ . Le polynôme  $A$  est strictement décroissant sur  $]-\infty, -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}]$  et strictement croissant sur  $[-\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, +\infty[$ . Puisque  $A(-1) = 0$ ,  $A\left(-\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right) = 1 - \frac{3}{2\sqrt[3]{2}} < 0$  (car  $\left(\frac{3}{2\sqrt[3]{2}}\right) = \frac{27}{16} < 1$ ) et  $A(0) = 1 > 0$ , le polynôme  $A$  admet exactement deux racines réelles à savoir  $-1$  et un réel  $t_0$  élément de  $]-\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, 0[$ . De plus,  $-1$  et  $t_0$  ne sont pas racines de  $A'$  et donc sont racines simples de  $A$ . Ainsi,

$$\begin{aligned} A &= (T+1)(T^3 - T^2 + T + 1) = (T+1)(T-t_0) \left( T^2 + (t_0-1)T - \frac{1}{t_0} \right) \\ &= (T^2 + (1-t_0)T - t_0) \left( T^2 + (t_0-1)T - \frac{1}{t_0} \right), \end{aligned}$$

le polynôme  $T^2 + (t_0-1)T - \frac{1}{t_0}$  n'ayant pas de racine réelle.  $U$  et  $V$  étant à coefficients réels, il n'y a qu'une possibilité, quitte à échanger les rôles de  $U$  et  $V$  :  $U = \lambda(T^2 + (1-t_0)T - t_0)$ ,  $\lambda > 0$ , et  $V = \frac{1}{\lambda} \left( T^2 + (t_0-1)T - \frac{1}{t_0} \right)$ ,  $\lambda > 0$ . Mais alors,  $V$  a un coefficient strictement négatif, à savoir  $\frac{1}{\lambda}(t_0-1)$ .

Donc l'un des polynômes  $U$  ou  $V$  est constant.

**b)** Soit  $X$  une variable aléatoire suivant la loi  $\mathcal{B}\left(2, \frac{1}{2}\right)$ .  $X$  est décomposable d'après la question 3. Pour  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$G_{X^2}(t) = P(X^2 = 0) + P(X^2 = 1)t + P(X^2 = 4)t^4 = P(X = 0) + P(X = 1)t + P(X = 2)t^4 = \frac{1}{4}t^4 + \frac{2}{4}t + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{4}(t^4 + 2t + 1) = \frac{1}{4}A(t)$$

et donc  $G_{X^2} = \frac{1}{4}A$ . Si  $X^2$  est décomposable,  $X = Y + Z$  où  $Y$  et  $Z$  sont indépendantes et  $Y$  et  $Z$  ne sont pas constantes presque sûrement.  $G_Y$  et  $G_Z$  sont des polynômes (car  $\forall k \geq 5, \mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(Z = k) = 0$ ) à coefficients positifs et de plus  $G_X = G_Y G_Z$  ou encore  $A = 4G_Y G_Z$ . Mais alors,  $G_Y$  ou  $G_Z$  est un polynôme constant d'après la question précédente ou encore  $Y$  ou  $Z$  est constante presque sûrement, ce qui n'est pas. Donc,  $X^2$  n'est pas décomposable.

## I.B - Variables uniformes

### I.B - 1) Variables uniformes décomposables

a) Soient  $Q = E\left(\frac{X}{a}\right)$  puis  $R = X - aE\left(\frac{X}{a}\right)$ .  $Q$  et  $R$  sont des valeurs aléatoires définies sur  $\Omega$ , à valeurs entières et  $R(\Omega) = \llbracket 0, a-1 \rrbracket$ .

b)  $(Q, R)(\Omega) = \llbracket 0, b-1 \rrbracket \times \llbracket 0, a-1 \rrbracket$  et pour  $(q, r) \in \llbracket 0, b-1 \rrbracket \times \llbracket 0, a-1 \rrbracket$ , l'événement  $(Q, R) = (q, r)$  est l'événement  $X = aq + r = k$  par unicité du quotient et du reste de la division euclidienne de  $k$  par  $a$ . Donc,  $\forall (q, r) \in \llbracket 0, b-1 \rrbracket \times \llbracket 0, a-1 \rrbracket$ ,  $\mathbb{P}((Q, R) = (q, r)) = \frac{1}{n}$ .

Soit  $(k, q) \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \times \llbracket 0, b-1 \rrbracket$ .  $Q = q \Leftrightarrow q \leq \frac{k}{a} < q+1 \Leftrightarrow aq \leq k < aq+a \Leftrightarrow aq \leq k \leq aq+a-1$ .  
 $\text{card}(\llbracket aq, aq+a-1 \rrbracket) = a$  et donc

$$\forall q \in \llbracket 0, b-1 \rrbracket, \mathbb{P}(Q = q) = \frac{a}{n} = \frac{1}{b}.$$

De même, les entiers  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$  tel que  $R = r \in \llbracket 0, a-1 \rrbracket$  sont les entiers  $r, a+r, \dots, (b-1)a+r$  et donc,  $\forall r \in \llbracket 0, a-1 \rrbracket, \mathbb{P}(R = r) = \frac{b}{n} = \frac{1}{a}$ .

c) Pour tout  $(k, q) \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \times \llbracket 0, b-1 \rrbracket$ ,

$$\mathbb{P}(Q = q) \times \mathbb{P}(R = r) = \frac{1}{b} \times \frac{1}{a} = \frac{1}{n} = \mathbb{P}((Q, R) = (q, r)).$$

Donc, les variables  $Q$  et  $R$  sont indépendantes et il en est de même des variables  $Y = aQ$  et  $Z = R$ . De plus,  $X = Y + Z$  et  $Y$  et  $Z$  ne sont pas constantes presque sûrement (car  $a \geq 2$  et  $b \geq 2$ ). Donc,  $X$  est décomposable.

$G_X = \frac{1}{n}(1 + T + \dots + T^{n-1})$ . D'après ce qui précède,

$$G_X = G_{aQ} G_R = \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{b}T^a + \frac{1}{b}T^{2a} + \dots + \frac{1}{b}T^{a(b-1)}\right) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a}T + \frac{1}{a}T^2 + \dots + \frac{1}{a}T^{a-1}\right)$$

$$= \frac{1}{n} \left(1 + T^a + T^{2a} + \dots + T^{a(b-1)}\right) (1 + T + T^2 + \dots + T^{a-1}).$$

### I.B - 2) Variables non uniformes décomposables

a) On pose  $P = 1 + T + \dots + T^{n-1} = \frac{T^n - 1}{T - 1}$ .

Si  $X$  est décomposable, il existe deux variables  $Y$  et  $Z$ , non constantes presque sûrement, à valeurs entières et indépendantes telles que  $X \sim Y + Z$ .  $U_1 = nG_Y$  et  $V_1 = G_Z$  sont alors des polynômes à coefficients positifs non constants tels que

$$P = nG_X = nG_Y G_Z = U_1 V_1,$$

puis  $U = \frac{U_1}{\text{dom}(U_1)}$  et  $V = \frac{V_1}{\text{dom}(V_1)} = \text{dom}(U_1) V_1$  sont deux polynômes unitaires non constants à coefficients positifs tels que  $P = UV$ . Par contraposition, si on établit le résultat de l'énoncé, alors  $X$  n'est pas décomposable.

On note que si  $n = 2$ ,  $P = 1 + T$  et il est déjà obligatoire que  $U$  ou  $V$  soit constant ou encore  $X$  n'est pas décomposable. On suppose dorénavant  $n$  premier supérieur ou égal à 3.

b) En particulier,  $n$  est impair. Les racines de  $P$  sont les  $n-1$  racines  $n$ -èmes de l'unité distinctes de 1 dans  $\mathbb{C}$  et puisque  $n$  est impair,  $-1$  est l'une de ses racines.  $U$  étant à coefficients réels et quitte à échanger les rôles de  $U$  et  $V$ ,  $U$  peut s'écrire

sous la forme  $U = (T+1) \prod_{k=1}^l (T - \omega_k) \left(T - \frac{1}{\omega_k}\right)$  (de sorte que  $r = 2l + 1$  est nécessairement impair) où les  $\omega_k$  sont des racines non réelles deux à deux distinctes de 1 dans  $\mathbb{C}$  (de sorte que  $\frac{1}{\omega_k} = \overline{\omega_k}$ ).

$$\begin{aligned} T^r U \left(\frac{1}{T}\right) &= T^r \left(\frac{1}{T} + 1\right) \prod_{k=1}^{(r-1)/2} \left(\frac{1}{T} - \omega_k\right) \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{\omega_k}\right) = (T+1) \prod_{k=1}^{(r-1)/2} (1 - T\omega_k) \left(1 - T\frac{1}{\omega_k}\right) \\ &= (T+1) \prod_{k=1}^{(r-1)/2} (-\omega_k) \left(-\frac{1}{\omega_k}\right) (T - \omega_k) \left(T - \frac{1}{\omega_k}\right) = (T+1) \prod_{k=1}^{(r-1)/2} (T - \omega_k) \left(T - \frac{1}{\omega_k}\right) \\ &= U. \end{aligned}$$

On note ensuite que  $T^n P \left(\frac{1}{T}\right) = P$  et donc,  $T^s V \left(\frac{1}{T}\right) = \frac{T^n P \left(\frac{1}{T}\right)}{T^r U \left(\frac{1}{T}\right)} = \frac{P}{U} = V$ .

c) L'égalité  $T^r U \left(\frac{1}{T}\right)$  fournit  $1 + u_{r-1}T + u_{r-2}T^2 + \dots + u_2T^{r-2} + u_1T^{r-1} + T^r = 1 + u_1T + u_{r-2}T^2 + \dots + u_{r-2}T^{r-2} + u_{r-1}T^{r-1} + T^r$  et donc  $\forall k \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket$ ,  $u_{r-k} = u_k$  (ce qui reste vrai quand  $k \in \llbracket 0, r \rrbracket$  car  $u_0 = u_r = 1$ ).

En identifiant les coefficients de  $T^r$ , dans l'égalité  $T = UV$ , on obtient

$$1 = u_r v_0 + u_{r-1} v_1 + u_{r-2} v_2 + \dots + u_1 v_{r-1} + u_0 v_r = 1 + \sum_{k=1}^r u_{r-k} v_k = 1 + \sum_{k=1}^r u_k v_k,$$

et donc  $\sum_{k=1}^r u_k v_k = 0$ . Puisque tous les  $u_k v_k$  sont des réels positifs, on en déduit que  $\forall k \in \llbracket 1, r \rrbracket$ ,  $u_k v_k = 0$ .

d) Montrons par récurrence que  $\forall k \in \llbracket 1, r \rrbracket$ ,  $u_k \in \{0, 1\}$  et  $v_k \in \{0, 1\}$ .

- En identifiant les coefficients de  $T$  dans l'égalité  $P = UV$ , on obtient  $u_1 + v_1 = 1$ . Puisque  $u_1 v_1 = 0$ , on a  $(u_1, v_1) \in \{0, 1\}^2$ .
- Soit  $k \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket$ . On suppose que  $\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ ,  $(u_i, v_i) \in \{0, 1\}^2$ . En identifiant les coefficients de  $T^{k+1}$  dans l'égalité  $P = UV$ , on obtient

$$1 = u_{k+1} + u_k v_1 + \dots + u_1 v_k + v_{k+1}$$

Par hypothèse de récurrence,  $u_k v_1 + \dots + u_1 v_k$  est un entier naturel. Si  $u_k v_1 + \dots + u_1 v_k \geq 2$ , alors  $u_{k+1} + v_{k+1} < 0$  ce qui est faux. Il ne reste que  $u_{k+1} + v_{k+1} \in \{0, 1\}$ . Si  $u_{k+1} + v_{k+1} = 0$ , alors  $u_{k+1} = v_{k+1} = 0$ . Si  $u_{k+1} + v_{k+1} = 1$ , puisque  $u_{k+1} v_{k+1} = 0$ , on a  $(u_{k+1}, v_{k+1}) = (1, 0)$  ou  $(u_{k+1}, v_{k+1}) = (0, 1)$ . Dans tous les cas,  $(u_{k+1}, v_{k+1}) \in \{0, 1\}^2$ .

Le résultat est démontré par récurrence.

e) Par le même raisonnement par récurrence qu'à la question précédente, en commençant par  $v_{r+1} \in \{0, 1\}$  obtenu en analysant le coefficient de  $T^{r+1}$ , on obtient  $\forall k \in \llbracket r+1, s-1 \rrbracket$ ,  $v_k \in \{0, 1\}$ .

On prend la valeur en 1. On obtient  $n = P(1) = U(1)V(1) = r_1 s_1$  où  $r_1$  et  $s_1$  sont le nombre de coefficients non nuls (et donc égaux à 1) de  $U$  et  $V$  respectivement. Puisque  $n$  est premier, on a  $r_1 = 1$  et  $s_1 = n$  ou  $r_1 = n$  et  $s_1 = 1$ . Mais  $r_1 = 1$  (resp.  $s_1 = 1$ ) fournit  $\deg(U) = 0$  (resp.  $\deg(V) = 0$ ) ce qui est une contradiction. Donc, il n'existe pas de polynômes non constants, unitaires, à coefficients positifs  $U$  et  $V$  tels que  $P = UV$  et on en déduit que  $X$  n'est pas décomposable.

## Partie II - Variables infiniment divisibles

### II.A - Variables bornées

II.A - 1) Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ . On peut trouver (d'après le résultat admis par l'énoncé)  $m$  variables indépendantes  $X_{m,1}, \dots, X_{m,m}$ , constantes égales à  $\frac{\alpha}{m}$  suivant la même loi que  $\frac{X}{m}$ . On a  $X \sim X_{m,1} + \dots + X_{m,m}$  et les variables  $X_{m,k}$ ,  $1 \leq k \leq m$ , ont la même loi.  $X$  est donc infiniment divisible.

II.A - 2) a) Si  $X_1 > \frac{M}{n}$  et  $X_2 > \frac{M}{n}$  et  $\dots$  et  $X_n > \frac{M}{n}$  alors  $X = X_1 + \dots + X_n > M$  ou encore  $\bigcap_{i=1}^n \left(X_i > \frac{M}{n}\right) \subset (X > M)$   
puis

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \left(X_i > \frac{M}{n}\right)\right) \leq \mathbb{P}(X > M) = 0.$$

Puisque les variables  $X_i$  sont indépendantes, on a encore  $\prod_{i=1}^n \mathbb{P}\left(X_i > \frac{M}{n}\right) = 0$  et donc  $\exists i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket / \mathbb{P}\left(X_{i_0} > \frac{M}{n}\right) = 0$ . Puisque les variables  $X_i$  ont la même loi, on en déduit que  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}\left(X_i > \frac{M}{n}\right) = 0$  puis que  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}\left(X_i \leq \frac{M}{n}\right) = 1$ .

De la même façon,  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}\left(X_i < -\frac{M}{n}\right) = 0$  et finalement

$$\mathbb{P}\left(|X_i| \leq \frac{M}{n}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(X_i > \frac{M}{n}\right) - \mathbb{P}\left(X_i < -\frac{M}{n}\right) = 1.$$

b) Puisque les variables  $X_i$  sont indépendantes et de mêmes lois,

$$V(X) = V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) = nV(X_1).$$

Ensuite, d'après la question précédente,  $\mathbb{P}\left(X_1^2 \leq \frac{M^2}{n^2}\right) = 1$  et  $\mathbb{P}\left(X_1^2 > \frac{M^2}{n^2}\right) = 0$  et donc

$$\begin{aligned} V(X_1) &= E(X_1^2) - E(X_1)^2 \\ &\leq E(X_1^2) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(X_1^2 = X_1^2(\omega)) X_1^2(\omega) \\ &= \sum_{\omega \in \Omega, X_1^2(\omega) \leq \frac{M^2}{n^2}} \mathbb{P}(X_1^2 = X_1^2(\omega)) X_1^2(\omega) + \sum_{\omega \in \Omega, X_1^2(\omega) > \frac{M^2}{n^2}} \mathbb{P}(X_1^2 = X_1^2(\omega)) X_1^2(\omega) \\ &= \sum_{\omega \in \Omega, X_1^2(\omega) \leq \frac{M^2}{n^2}} \mathbb{P}(X_1^2 = X_1^2(\omega)) X_1^2(\omega) \\ &\leq \frac{M^2}{n^2} \sum_{\omega \in \Omega, X_1^2(\omega) \leq \frac{M^2}{n^2}} \mathbb{P}(X_1^2 = X_1^2(\omega)) \\ &\leq \frac{M^2}{n^2} \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(X_1^2 = X_1^2(\omega)) = \frac{M^2}{n^2} \end{aligned}$$

et donc,

$$V(X) = nV(X_1) \leq n \frac{M^2}{n^2} = \frac{M^2}{n}.$$

**II.A - 3)** Ainsi, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $0 \leq V(X) \leq \frac{M^2}{n}$ . Quand  $n$  tend vers  $+\infty$ , on obtient  $V(X) = 0$  ou encore  $\mathbb{P}(X = E(X)) = \mathbb{P}((X - E(X))^2 = 0) = 1$  et donc  $X$  est constante presque sûrement.

### II.B - Etude du caractère infiniment divisible de quelques variables entières

**II.B - 1)** Soit  $X$  une variable aléatoire suivant la loi binomiale  $\mathcal{B}(m, p)$ ,  $m \in \mathbb{N}^*$  et  $p \in [0, 1]$ .  $X$  bornée ( $X$  est à valeurs dans  $\llbracket 0, m \rrbracket$ ) et donc  $X$  est infiniment divisible si et seulement si  $X$  est constante presque sûrement. Ceci est équivalent à  $p = 0$  ou  $p = 1$ .

**II.B - 2)** On pose  $X = X_1 + \dots + X_n$  et  $\lambda = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$ . Puisque les variables  $X_i$  sont indépendantes, pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k)t^k &= G_X(t) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t) = \prod_{i=1}^n \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda_i^k e^{-\lambda_i}}{k!} t^k \right) \\
&= \prod_{i=1}^n e^{\lambda_i(t-1)} \text{ (on a redémontré un résultat de cours)} \\
&= e^{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)(t-1)} = e^{\lambda(t-1)} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} t^k
\end{aligned}$$

et donc, par unicité des coefficients d'une série entière,  $\forall k \in \mathbb{N}$ ,  $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$  ou encore  $X$  suit une loi de POISSON de paramètre  $\lambda$  (on a redémontré un autre résultat de cours).

**II.B - 3)** Soit  $X$  une variable aléatoire suivant une loi de POISSON de paramètre  $\lambda$ . Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Soient  $X_1, \dots, X_n$ ,  $n$  variables aléatoires indépendantes suivant une même loi de POISSON de paramètre  $\frac{\lambda}{n}$ . D'après la question précédente,  $X \sim X_1 + \dots + X_n$ .  $X$  est donc infiniment divisible.

**II.B - 4)** D'après la question précédente, chaque  $X_i$ ,  $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ , est infiniment décomposable : si, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $X_1^{(i)}, \dots, X_n^{(i)}$ ,  $n$  variables aléatoires indépendantes suivant une loi de POISSON de paramètre  $\frac{\lambda_i}{n}$ , alors  $X_1^{(i)} + \dots + X_n^{(i)}$  suit une loi de POISSON de paramètre  $\lambda_i$  ou encore  $X_i \sim X_1^{(i)} + \dots + X_n^{(i)}$ .

On en déduit que chaque  $iX_i$ ,  $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ , est infiniment décomposable car pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $iX_i \sim iX_1^{(i)} + \dots + iX_n^{(i)}$ , les  $iX_k^{(i)}$ ,  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , étant indépendantes.

Il reste à démontrer que la somme des  $r$  variables indépendantes  $iX_i$ ,  $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ , est infiniment décomposable. Posons  $X = \sum_{i=1}^r iX_i$ .

Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ . Pour chaque  $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ , il existe des variables indépendantes à valeurs dans  $\mathbb{N}$ , ayant la même loi,  $X_{m,1}^{(i)}, \dots, X_{m,m}^{(i)}$ , telles que  $iX_i \sim X_{m,1}^{(i)} + \dots + X_{m,m}^{(i)}$ .

$$\begin{aligned}
G_X &= \prod_{i=1}^r G_{iX_i} = \prod_{i=1}^r \left( \prod_{k=1}^m G_{m,k}^{(i)} \right) = \prod_{i=1}^r \left( G_{m,1}^{(i)} \right)^m \\
&= \left( \prod_{i=1}^r G_{m,1}^{(i)} \right)^m
\end{aligned}$$

Posons  $G_m = \prod_{i=1}^r G_{m,1}^{(i)}$ .  $G_m$  est un produit de séries entières de rayon au moins 1 à coefficients positifs et est donc une série entière de rayon au moins 1 à coefficients positifs. De plus,  $G_m(1) = \prod_{i=1}^r G_{m,1}^{(i)}(1)$ . Ainsi, les coefficients  $a_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , de la série entière de somme  $G_m$  sont dans  $[0, 1]$  et de somme 1.

On peut donc trouver  $m$  variables indépendantes à valeurs dans  $\mathbb{N}$ ,  $X_{m,1}, \dots, X_{m,m}$ , de même loi dont la fonction génératrice associée est  $G_m$ .

$$G_{X_{m,1} + \dots + X_{m,m}} = \prod_{i=1}^m G_{X_{m,i}} = (G_m)^m = G_X$$

ou encore  $X \sim X_{m,1} + \dots + X_{m,m}$ . On a montré que  $\sum_{i=1}^r iX_i$  est infiniment décomposable.

## II.C - Séries de variables aléatoires à valeurs entières

**II.C - 1) a)** Soit  $(A, B) \in \mathcal{A}^2$ .

$$\begin{aligned}
|\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)| &= |\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) - \mathbb{P}(B)| \leq \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) + |\mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(B)| = \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \\
&= \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) + \mathbb{P}(\bar{A} \cap B).
\end{aligned}$$

b) Soit  $t \in [-1, 1]$ .

$$\begin{aligned}
|G_X(t) - G_Y(t)| &\leq \sum_{n=0}^{+\infty} |\mathbb{P}(X = n) - \mathbb{P}(Y = n)| |t|^n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |\mathbb{P}(X = n) - \mathbb{P}(Y = n)| \\
&\leq \sum_{n=0}^{+\infty} (\mathbb{P}((X = n) \cap (Y \neq n)) + \mathbb{P}((X \neq n) \cap (Y = n))) \\
&= \mathbb{P}(X \neq Y) + \mathbb{P}(X \neq Y) = 2\mathbb{P}(X \neq Y).
\end{aligned}$$

II.C - 2) a) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Pour  $\omega \in \Omega$ ,

$$\omega \in Z_{n+1} \Rightarrow \exists i \geq n+1 / U_i(\omega) \neq 0 \Rightarrow \exists i \geq n / U_i(\omega) \neq 0 \Rightarrow \omega \in Z_n.$$

Donc, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $Z_{n+1} \subset Z_n$  ou encore la suite  $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est décroissante. D'autre part,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $Z_n = \bigcup_{i \geq n} (U_i \neq 0)$  et donc

$$0 \leq \mathbb{P}(Z_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geq n} (U_i \neq 0)\right) \leq \sum_{i=n}^{+\infty} \mathbb{P}(U_i \neq 0).$$

$R_{n-1} = \sum_{i=n}^{+\infty} \mathbb{P}(U_i \neq 0)$  est le reste à l'ordre  $n-1$  d'une série numérique convergente. On sait  $R_n$  tend vers 0 et on en déduit que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(Z_n) = 0$ .

b)  $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une suite d'événements, décroissante pour l'inclusion. Par continuité décroissante,  $\mathbb{P}(Z_n)$  tend vers  $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=0}^{+\infty} Z_k\right)$  et donc,  $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=0}^{+\infty} Z_k\right) = 0$ . Maintenant,

$$\begin{aligned}
\{\omega \in \Omega / \{i \in \mathbb{N}^* / U_i(\omega) \neq 0\} \text{ est infini}\} &= \bigcap_{n=1}^{+\infty} \{\omega \in \Omega / \exists i \geq n / U_i(\omega) \neq 0\} \\
&= \bigcap_{n=1}^{+\infty} Z_n
\end{aligned}$$

et donc  $\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega / \{i \in \mathbb{N}^* / U_i(\omega) \neq 0\} \text{ est infini}\}) = 0$  puis  $\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega / \{i \in \mathbb{N}^* / U_i(\omega) \neq 0\} \text{ est fini}\}) = 1$ .

c) Soit  $\omega_0$  un élément de  $\{\omega \in \Omega / \{i \in \mathbb{N}^* / U_i(\omega) \neq 0\} \text{ est fini}\}$ . Les  $U_i(\omega_0)$ ,  $i \in \mathbb{N}^*$ , sont nuls à partir d'un certain rang ou encore la suite  $(S_n(\omega_0))_{n \in \mathbb{N}^*}$  est constante à partir d'un certain rang. Pour un tel  $\omega_0$ , la série de terme général  $U_i(\omega_0)$ ,  $i \in \mathbb{N}^*$ , converge ou encore  $S(\omega_0)$  est défini.

Ainsi, l'ensemble des  $\omega$  pour lesquels  $S(\omega)$  est défini (qui contient l'ensemble des  $\omega_0$  précédents) est un événement de probabilité 1 ou encore  $S$  est définie presque sûrement.

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . D'après la question II.C.1.b,

$$\forall t \in [-1, 1], |G_{S_n}(t) - G_S(t)| \leq 2\mathbb{P}(S_n \neq S)$$

puis

$$\sup\{|G_{S_n}(t) - G_S(t)|, t \in [-1, 1]\} \leq 2\mathbb{P}(S_n \neq S).$$

Puisque les  $U_i$  sont à valeurs dans  $\mathbb{N}$ , la suite  $(S_n \neq S)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une suite décroissante pour l'inclusion. Par continuité décroissante,  $\mathbb{P}(S_n \neq S)$  tend vers  $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{+\infty} (S_k \neq S)\right) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega / \{i \in \mathbb{N}^* / U_i(\omega) \neq 0\} \text{ est infini}\}) = 0$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

Puisque  $2\mathbb{P}(S_n \neq S)$  tend vers 0 quand  $n$  tend vers  $+\infty$ , on en déduit que la suite de fonctions  $(G_{S_n})$  converge uniformément vers la fonction  $G_S$  sur  $[-1, 1]$ .

**II.C - 3) a)** Soit  $i \in \mathbb{N}$ .  $\mathbb{P}(X_i \neq 0) = 1 - \mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - e^{-\lambda_i}$ . Puisque la série de terme général positif  $\lambda_i$ ,  $i \in \mathbb{N}$ , converge,  $\lim_{i \rightarrow +\infty} \lambda_i = 0$ . Mais alors

$$\mathbb{P}(X_i \neq 0) = 1 - e^{-\lambda_i} \underset{i \rightarrow +\infty}{=} \lambda_i + o(\lambda_i).$$

Ceci montre que la série de terme général  $\mathbb{P}(X_i \neq 0)$  converge.

b) D'après la question II.C.2.c, la série  $\sum_{n \geq 1} X_i$  est presque sûrement convergente.

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . D'après la question II.B.2,  $S_n = X_1 + \dots + X_n$  suit une loi de POISSON de paramètre  $\Lambda_n = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$ . Par suite, pour tout réel  $t$ ,

$$G_{S_n}(t) = e^{\Lambda_n(t-1)}.$$

Pour  $t \in \mathbb{R}$ ,  $G_{S_n}(t) = e^{\Lambda_n(t-1)}$  tend vers  $e^{\lambda(t-1)}$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ . D'après la question II.C.2.c, la suite  $(G_{S_n})_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément sur  $[-1, 1]$  vers  $G_S$  et donc

$$\forall t \in [-1, 1], G_S(t) = e^{\lambda(t-1)}.$$

Mais alors, d'après la question I.A.1,  $S$  suit une loi de POISSON de paramètre  $\lambda$ .

c) Pour  $i \geq 1$ ,  $\mathbb{P}(iX_i \neq 0) = \mathbb{P}(X_i \neq 0)$  et donc, la série de terme général  $\mathbb{P}(iX_i \neq 0)$ ,  $i \in \mathbb{N}$ , converge. Puisque les  $iX_i$  sont des variables indépendantes à valeurs dans  $\mathbb{N}$ , la série  $\sum_{i \geq 1} iX_i$  est presque sûrement convergente d'après la question

II.C.2.c. On pose dorénavant  $S = \sum_{i=1}^{+\infty} iX_i$ .

Soit  $m \in \mathbb{N}^*$  fixé. Pour  $r \in \mathbb{N}^*$  donné, on a montré à la question II.C.3.c l'existence de  $Y_{r,1}, \dots, Y_{r,m}$  variables indépendantes à valeurs dans  $\mathbb{N}$ , suivant une même loi telles que  $S_r \sim Y_{r,1} + \dots + Y_{r,m}$ . Les fonctions génératrices vérifient

$$G_{S_r} = \prod_{k=1}^m G_{Y_{r,k}} = (G_{Y_{r,1}})^m$$

et donc, pour  $t \geq 0$ ,  $G_{Y_{r,1}}(t) = (G_{S_r}(t))^{\frac{1}{m}}$ .  $(G_{S_r})$  converge vers  $G_S$  sur  $[0, 1]$  quand  $r$  tend vers  $+\infty$  et donc  $G_{Y_{r,1}}$  converge vers  $G_S^{\frac{1}{m}}$  sur  $[0, 1]$ . Si on montre que  $G_S^{\frac{1}{m}}$  est une fonction génératrice, on peut trouver  $m$  variables indépendantes  $Z_1, \dots, Z_m$  de fonctions génératrice  $G_S^{\frac{1}{m}}$  (et donc de mêmes lois) telles que  $G_S = G_{Z_1}^m = G_{Z_1} \dots G_{Z_m}$  et donc telles que  $S \sim Z_1 + \dots + Z_m$ . On aura ainsi montré que  $S$  est infiniment divisible.

Vérifions donc que  $G_S^{\frac{1}{m}}$  est une fonction génératrice pour  $m \in \mathbb{N}^*$  fixé. Soit  $r \in \mathbb{N}^*$ . Les variables  $iX_i$  sont indépendantes et donc, pour  $t \in \mathbb{R}$  et  $r \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\begin{aligned} G_{S_r}(t) &= \prod_{i=1}^r G_{iX_i}(t) = \prod_{i=1}^r \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(iX_i = k) t^k \right) = \prod_{i=1}^r \left( \sum_{k \in i\mathbb{N}} \mathbb{P}(iX_i = k) t^k \right) \\ &= \prod_{i=1}^r \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(iX_i = ik) t^{ik} \right) = \prod_{i=1}^r \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda_i^k e^{-\lambda_i}}{k!} t^{ik} \right) = \prod_{i=1}^r e^{\lambda_i(t^i-1)} \\ &= e^{-\sum_{i=1}^r \lambda_i} e^{\sum_{i=1}^r \lambda_i t^i}. \end{aligned}$$

puis pour  $t \in [-1, 1]$ ,  $G_S(t) = e^{-\lambda} e^{\sum_{i=1}^{+\infty} \lambda_i t^i}$  (en particulier,  $G_S(t) > 0$ ) et donc

$$G_S^{\frac{1}{m}}(t) = e^{-\frac{\lambda}{m}} e^{\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{\lambda_i}{m} t^i}.$$

Puisque  $e^{-\lambda} e^{\sum_{i=1}^{+\infty} \lambda_i t^i}$  est une fonction génératrice à savoir  $G_S$ , il en est de même  $e^{-\frac{\lambda}{m}} e^{\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{\lambda_i}{m} t^i}$  en appliquant le résultat aux réels positifs  $\frac{\lambda_i}{m}$ .

### *Partie III - Variables entières infiniment divisibles : étude générale*

### III.A - Série entière auxiliaire

**III.A - 1)** On montre par récurrence sur  $k$  l'existence et l'unicité de chaque  $\lambda_k$ ,  $k \in \mathbb{N}^*$ .

- $1 \times \mathbb{P}(X = 1) = \sum_{j=1}^1 j\lambda_j \mathbb{P}(X = 1 - j) \Leftrightarrow \mathbb{P}(X = 1) = \lambda_1 \mathbb{P}(X = 0) \Leftrightarrow \lambda_1 = \frac{\mathbb{P}(X = 1)}{\mathbb{P}(X = 0)}$  (car  $\mathbb{P}(X = 0) \neq 0$ ).

Le résultat est vrai quand  $k = 1$ .

- Soit  $k \geq 1$ . Supposons l'existence et l'unicité de  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  vérifiant  $\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ ,  $i\mathbb{P}(X = i) = \sum_{j=1}^i j\lambda_j \mathbb{P}(X = i - j)$ .

$$(k+1)\mathbb{P}(X = k+1) = \sum_{j=1}^{k+1} j\lambda_j \mathbb{P}(X = k+1-j) \Leftrightarrow (k+1)\lambda_{k+1}\mathbb{P}(X = 0) = (k+1)\mathbb{P}(X = k+1) - \sum_{j=1}^k j\lambda_j \mathbb{P}(X = k+1-j)$$

$$\Leftrightarrow \lambda_{k+1} = \frac{1}{(k+1)\mathbb{P}(X = 0)} \left( (k+1)\mathbb{P}(X = k+1) - \sum_{j=1}^k j\lambda_j \mathbb{P}(X = k+1-j) \right),$$

d'où l'existence et l'unicité de  $\lambda_{k+1}$ .

Le résultat est démontré par récurrence.

**III.A - 2)** Soit  $k \geq 1$ . Si  $k \geq 2$ ,  $k\lambda_k \mathbb{P}(X = 0) = k\mathbb{P}(X = k) - \sum_{j=1}^{k-1} j\lambda_j \mathbb{P}(X = k - j)$  puis

$$|\lambda_k| \mathbb{P}(X = 0) = \left| \mathbb{P}(X = k) - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{j}{k} \lambda_j \mathbb{P}(X = k - j) \right|$$

$$\leq \mathbb{P}(X = k) + \sum_{j=1}^{k-1} \frac{j}{k} |\lambda_j| \mathbb{P}(X = k - j) \leq \mathbb{P}(X = k) + \sum_{j=1}^{k-1} |\lambda_j| \mathbb{P}(X = k - j).$$

ce qui reste vrai pour  $k = 1$  avec la convention qu'une somme vide est nulle.

Ensuite, puisque  $k \geq 1$ , pour tout  $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ ,  $\mathbb{P}(X = i) \leq \mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0)$  et donc

$$\mathbb{P}(X = k) + \sum_{j=1}^{k-1} |\lambda_j| \mathbb{P}(X = k - j) \leq 1 - \mathbb{P}(X = 0) + \sum_{j=1}^{k-1} |\lambda_j| (1 - \mathbb{P}(X = 0)) = (1 - \mathbb{P}(X = 0)) \left( 1 + \sum_{i=1}^{k-1} |\lambda_i| \right).$$

**III.A - 3)** Montrons par récurrence que  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $|\lambda_k| \leq \frac{1}{\mathbb{P}(X = 0)^k}$ .

- D'après la question précédente,  $|\lambda_1| \leq \frac{1 - \mathbb{P}(X = 0)}{\mathbb{P}(X = 0)} \times 1 \leq \frac{1}{\mathbb{P}(X = 0)}$ . L'inégalité est vraie quand  $k = 1$ .

- Soit  $k \geq 2$ . Supposons que  $\forall j \in \llbracket 1, k - 1 \rrbracket$ ,  $|\lambda_j| \leq \frac{1}{\mathbb{P}(X = 0)^j}$ .

$$|\lambda_k| \leq \frac{1 - \mathbb{P}(X = 0)}{\mathbb{P}(X = 0)} \left( 1 + \sum_{j=1}^{k-1} |\lambda_j| \right) \leq \frac{1 - \mathbb{P}(X = 0)}{\mathbb{P}(X = 0)} \left( \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{\mathbb{P}(X = 0)^j} \right)$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{si } \mathbb{P}(X = 0) = 1 \\ \frac{1 - \mathbb{P}(X = 0)}{\mathbb{P}(X = 0)} \frac{\frac{1}{\mathbb{P}(X = 0)^k} - 1}{\frac{1}{\mathbb{P}(X = 0)} - 1} & \text{si } \mathbb{P}(X = 0) \in ]0, 1[ \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{si } \mathbb{P}(X = 0) = 1 \\ \frac{1}{\mathbb{P}(X = 0)^k} - 1 & \text{si } \mathbb{P}(X = 0) \in ]0, 1[ \end{cases} = \frac{1}{\mathbb{P}(X = 0)^k} - 1$$

$$\leq \frac{1}{\mathbb{P}(X = 0)^k}.$$

Le résultat est démontré par récurrence.

**III.A - 4)** Soit  $t \in ]-\mathbb{P}(X=0), \mathbb{P}(X=0)[$ . Pour  $k \geq 1$ ,  $|\lambda_k t^k| \leq \left(\frac{|t|}{\mathbb{P}(X=0)}\right)^k$ . Or,  $\frac{|t|}{\mathbb{P}(X=0)} < 1$  et donc la série géométrique de terme général  $\left(\frac{|t|}{\mathbb{P}(X=0)}\right)^k$ ,  $k \in \mathbb{N}^*$ , converge. On en déduit la série de terme général  $\lambda_k t^k$ ,  $k \in \mathbb{N}^*$ , est absolument convergente.

Ainsi, pour tout  $t \in ]-\mathbb{P}(X=0), \mathbb{P}(X=0)[$ , la série de terme général  $\lambda_k t^k$ ,  $k \in \mathbb{N}^*$ , converge et on en déduit que  $\rho(X) \geq \mathbb{P}(X=0)$ .

**III.A - 5)** On note  $R(X)$  le rayon de la série entière de somme  $G_X$ . On a  $R(X) \geq 1$  mais je n'ai pas réussi à vérifier que  $R(X) \geq \rho(X)$ . Soit donc  $t \in ]-\text{Min}\{\rho(X), R(X)\}, \text{Min}\{\rho(X), R(X)\}[$ .

$$\begin{aligned} H'_X(t)G_X(t) &= \left(\sum_{j=1}^{+\infty} j\lambda_j t^{j-1}\right) \left(\sum_{i=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X=i)t^i\right) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\sum_{i+j-1=k-1, i \geq 0, j \geq 1} j\lambda_j \mathbb{P}(X=i)\right) t^{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\sum_{j=1}^k j\lambda_j \mathbb{P}(X=k-j)\right) t^{k-1} = \sum_{k=1}^{+\infty} k\mathbb{P}(X=k)t^{k-1} \\ &= G'_X(t). \end{aligned}$$

Par suite,  $G'_X e^{-H_X} - H'_X e^{-H_X} G = 0$  puis  $(G_X e^{-H_X})' = 0$  puis, pour tout  $t \in ]-\text{Min}\{\rho(X), R(X)\}, \text{Min}\{\rho(X), R(X)\}[$ ,

$$G_X(t)e^{-H_X(t)} = G_X(0)e^{-H_X(0)} = \mathbb{P}(X=0) \times e^{-\ln(\mathbb{P}(X=0))} = 1,$$

et finalement,  $\forall t \in ]-\text{Min}\{\rho(X), R(X)\}, \text{Min}\{\rho(X), R(X)\}[$ ,  $G_X(t) = e^{H_X(t)}$ .

On en déduit que pour  $t \in ]-\text{Min}\{\rho(X), R(X)\}, \text{Min}\{\rho(X), R(X)\}[$ ,  $G_X(t) > 0$  et  $H_X(t) = \ln(G_X(t))$ .

**III.A - 6)** On suppose que  $\mathbb{P}(X=0) > 0$  et  $\mathbb{P}(Y=0) > 0$ . Puisque  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, pour  $t \in ]-\text{Min}\{\rho(X), \rho(Y)\}, \text{Min}\{\rho(X), \rho(Y)\}[$ ,

$$H_{X+Y}(t) = \ln(G_{X+Y}(t)) = \ln(G_X(t) \times G_Y(t)) = \ln(G_X(t)) + \ln(G_Y(t)) = H_X(t) + H_Y(t).$$

### III.B - Variables aléatoires entières $\lambda$ -positives

**III.B - 1)** Soit  $k \geq 1$ . Puisque les  $\lambda_j$  sont des réels positifs,

$$k\mathbb{P}(X=k) = \sum_{j=1}^k j\lambda_j \mathbb{P}(X=k-j) \geq k\lambda_k \mathbb{P}(X=k-k) = k\lambda_k \mathbb{P}(X=0)$$

et donc, puisque  $\mathbb{P}(X=0) > 0$ ,  $\lambda_k \leq \frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=0)}$ .

La série numérique de terme général  $\frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=0)}$ ,  $k \geq 1$ , converge et a pour somme  $\frac{1 - \mathbb{P}(X=0)}{\mathbb{P}(X=0)}$  et pour tout  $k \geq 1$ ,

$0 \leq \lambda_k \leq \frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=0)}$ . Donc, la série numérique de terme général  $\lambda_k$ ,  $k \geq 1$ , converge.

**III.B - 2)** Puisque la série numérique de terme général positif  $\lambda_j$ ,  $j \geq 1$ , converge, la série entière de somme  $H_X$  est normalement et en particulier uniformément convergente sur  $[-1, 1]$ . On en déduit que  $H_X$  est continue sur  $[-1, 1]$ , dérivable sur  $] -1, 1[$  (au moins) et que sa dérivée s'obtient par dérivation terme à terme :

$$\forall t \in ] -1, 1[, H'_X(t) = \sum_{j=1}^{+\infty} j\lambda_j t^{j-1}.$$

De même, la série de terme général positif  $\mathbb{P}(X=i)$ ,  $i \geq 0$ , converge, la fonction  $G_X$  est continue sur  $[-1, 1]$ , dérivable sur  $] -1, 1[$  et

$$\forall t \in ] -1, 1[, G'_X(t) = \sum_{i=1}^{+\infty} i\mathbb{P}(X=i)t^{i-1}.$$

En effectuant le produit de CAUCHY sur  $] - 1, 1[$  des séries entières de sommes respectives  $H'_X$  et  $G_X$ , on obtient comme à la question III.A.5,

$$\forall t \in ] - 1, 1[, G'_X(t) = H'_X(t)G_X(t).$$

En particulier, pour  $t = 1$ , on obtient  $\ln(\mathbb{P}(X = 0)) + \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda_k = H_X(1) = \ln(G_X(1)) = \ln\left(\sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k)\right) = \ln(1) = 0$ .

**III.B - 3)** On sait d'après la question II.C.3.c que la série  $\sum_{i \geq 1} iX_i$  est presque sûrement convergente ou encore la variable

$$S = \sum_{i=1}^{+\infty} iX_i \text{ est presque sûrement définie.}$$

On a montré à la question II.C.3 que si  $G_S = \sum_{i=1}^{+\infty} iX_i$ , alors pour tout  $t \in [-1, 1]$ ,

$$G_S(t) = e^{-\lambda} e^{\sum_{i=1}^{+\infty} \lambda_i t^i} = G_X(t).$$

Donc  $X$  et  $\sum_{i=1}^{+\infty} iX_i$  suivent la même loi.

### III.C - Caractérisation des variables entières infiniment divisibles

**III.C - 1) a)** On pose  $S_n = X_{n,1} + \dots + X_{n,n}$ .

Si pour un événement élémentaire  $\omega$ , on a  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, X_{n,i}(\omega) < 0$ , alors on a  $S_n(\omega) < 0$  et donc  $\bigcap_{i=1}^n (X_{n,i} < 0) \subset S_n < 0$

$$\text{puis } \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n (X_{n,i} < 0)\right) \leq \mathbb{P}(S_n < 0) = 0.$$

Donc,  $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n (X_{n,i} < 0)\right) = 0$ . Puisque les  $X_{n,i}$ ,  $1 \leq i \leq n$ , sont indépendantes et de mêmes lois, on en déduit que  $\mathbb{P}(X_{n,1} < 0)^n = 0$  puis  $\mathbb{P}(X_{n,1} < 0) = 0$ .

Donc,  $X_{n,1}$  (et plus généralement chaque  $X_{n,k}$ ,  $1 \leq k \leq n$ ) est presque sûrement positive ou nulle.

$$\text{b) } (S_n = 0) = \left( \left( \bigcap_{i=1}^n (X_{n,i} \geq 0) \right) \cap (X_{n,1} + \dots + X_{n,n} = 0) \right) \cup \left( (\exists i / X_{n,i} < 0) \cap (X_{n,1} + \dots + X_{n,n} = 0) \right) = \left( \bigcap_{i=1}^n (X_{n,i} = 0) \right) \cup \left( (\exists i / X_{n,i} < 0) \cap (X_{n,1} + \dots + X_{n,n} = 0) \right) \text{ puis}$$

$$\mathbb{P}(S_n = 0) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n (X_{n,i} = 0)\right) + 0 = \mathbb{P}(X_{n,1} = 0)^n.$$

On en déduit que  $\mathbb{P}(X_{n,1} = 0)^n = \mathbb{P}(S_n = 0) = \mathbb{P}(X = 0) > 0$  et donc que  $\mathbb{P}(X_{n,1} = 0) > 0$  (et plus généralement,  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(X_{n,k} = 0) > 0$ ).

**c)**  $\mathbb{P}((X_{n,1} \notin \mathbb{N}) \cap (X_{n,2} = 0) \cap \dots \cap (X_{n,n} = 0)) \leq \mathbb{P}(S_n \notin \mathbb{N}) = 0$  et donc, les variables  $X_{n,1}$  étant indépendantes,

$$\mathbb{P}(X_{n,1} \notin \mathbb{N}) \times \mathbb{P}(X_{n,2} = 0) \times \dots \times \mathbb{P}(X_{n,n} = 0) = 0.$$

Puisque pour  $k \geq 2$ ,  $\mathbb{P}(X_{n,k} = 0) \neq 0$ , on en déduit que  $\mathbb{P}(X_{n,1} \notin \mathbb{N}) = 0$ . Plus généralement, pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $\mathbb{P}(X_{n,i} \notin \mathbb{N}) = 0$  ou encore les variables aléatoires  $X_{n,i}$  sont presque sûrement à valeurs dans  $\mathbb{N}$ .

**III.C - 2) a)** D'après la question III.C.1.b, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\mathbb{P}(X_{n,1} = 0) = (\mathbb{P}(X = 0))^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln(\mathbb{P}(X=0))}{n}} \text{ (car } \mathbb{P}(X = 0) > 0 \text{).}$$

On a donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_{n,1} = 0) = e^0 = 1$ .

**b)** Soit  $i \in \mathbb{N}^*$ .  $0 \leq \mathbb{P}(X_{n,1} = i) = 1 - \sum_{k \neq i} \mathbb{P}(X_{n,1} = k) \leq 1 - \mathbb{P}(X_{n,1} = 0)$ . Quand  $n$  tend vers  $+\infty$ , on obtient

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_{n,1} = i) = 0.$$

**III.C - 3) a)** Les  $X_{n,i}$  sont indépendantes. D'après la question III.A.6, par récurrence (puisque  $X_{n,1} + \dots + X_{n,n-1}$  et  $X_{n,n}$  sont indépendantes d'après le lemme des coalitions)

$$H_X = H_{X_{n,1}} + \dots + H_{X_{n,n}} = nH_n.$$

**b)** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Si on note  $\mu_k, k \geq 1$ , les coefficients de la série entière  $H_n$ , par unicité des coefficients d'une série entière, on a  $\forall k \geq 1, n\mu_k = \lambda_k$ . Par définition,

$$\forall k \geq 1, k\mathbb{P}(X_{n,1} = k) = \sum_{j=1}^k j\mu_j \mathbb{P}(X_{n,1} = k-j)$$

et donc

$$\forall k \geq 1, n\mathbb{P}(X_{n,1} = k) = \sum_{j=1}^k j\lambda_j \mathbb{P}(X_{n,1} = k-j)$$

**III.C - 4)** Pour  $n$  et  $k$  dans  $\mathbb{N}^*$ ,

$$n\mathbb{P}(X_{n,1} = k) = \sum_{j=1}^k \frac{j}{k} \lambda_j \mathbb{P}(X_{n,1} = k-j) = \lambda_k \mathbb{P}(X_{n,1} = 0) + \sum_{j=1}^k \frac{j}{-1} \lambda_j \mathbb{P}(X_{n,1} = k-j).$$

Quand  $n$  tend vers  $+\infty$ ,  $n\mathbb{P}(X_{n,1} = k)$  tend vers  $\lambda_k$  d'après les questions II.C.2.a et II.C.2.b.

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $n\mathbb{P}(X_{n,1} = k) \geq 0$  et donc, quand  $n$  tend vers  $+\infty$ , on obtient  $\lambda_k \geq 0$ .  $X$  est donc  $\lambda$ -positive.

### III.C - 5) Conclusion

**a)** La question III.C.4 montre (i)  $\Rightarrow$  (ii). La question III.B.3 montre (ii)  $\Rightarrow$  (iii). La question II.c.3.c montre (iii)  $\Rightarrow$  (i). On a donc l'équivalence des trois conditions (i), (ii) et (iii).

**b)** Soit  $X$  une variable à valeurs dans  $\mathbb{N}^*$  et soit  $c \in \mathbb{R}$ . On peut trouver une variable constante  $Y = c$  telle que  $X$  et  $Y$  soient indépendantes.  $Y$  est infiniment divisible d'après la question II.A.1. Si  $X$  est infiniment divisible, alors  $X + c$  l'est en adaptant la démonstration de la question II.B.4. Inversement, si  $X + c$  est infiniment divisible, alors  $X + c - c = X$  est infiniment divisible.

Ainsi,  $X$  est infiniment divisible si et seulement si  $X-1$  l'est. Donc, si  $\mathbb{P}(X = 1) > 0$ , alors (i), (ii) et (iii) sont équivalentes.

**c)** La variable  $Y = X - 1$  suit la loi :  $\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(Y = k) = (1-p)^k p$ . ( $Y = 0$ ) =  $p > 0$ . Ensuite, pour tout réel  $t \in \left] -\frac{1}{1-p}, \frac{1}{1-p} \right[$ ,

$$G_Y(t) = p \sum_{k=0}^{+\infty} ((1-p)t)^k = \frac{p}{1 - (1-p)t}$$

et donc

$$\begin{aligned} H_Y(t) &= \ln(p) - \ln(1 - (1-p)t) \\ &= \ln(p) + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(1-p)^k}{k} t^k. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout  $k \geq 1, \lambda_k = \frac{(1-p)^k}{k} \geq 0$ . Puisque (ii) est vérifiée,  $Y$  est infiniment divisible puis  $X$  est infiniment divisible.