

Inégalités de convexité

Exercice 1 [01398] [correction]

Observer les inégalités suivantes par un argument de convexité.

a) $\forall x \in [0, \pi/2], \frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$ b) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \geq 0, x^{n+1} - (n+1)x + n \geq 0$

Exercice 2 [01399] [correction]

Montrer que $f :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \ln(\ln x)$ est concave.

En déduire

$$\forall (x, y) \in]1, +\infty[^2, \ln \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{\ln x \cdot \ln y}$$

Exercice 3 [01400] [correction]

Montrer

$$\forall x_1, \dots, x_n > 0, \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Exercice 4 [01401] [correction]

Soient $p, q > 0$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Montrer que pour tout $a, b > 0$ on a

$$\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \geq ab$$

Exercice 5 [03172] [correction]

Soient $a, b \in \mathbb{R}^+$ et $t \in]0, 1[$. Montrer

$$a^t b^{1-t} \leq ta + (1-t)b$$

Exercice 6 [01404] [correction]

[Inégalité de Hölder]

Soient $p, q > 0$ tels que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

a) En exploitant la concavité de $x \mapsto \ln x$, établir que pour tout $a, b \in \mathbb{R}^+$, on a

$$\sqrt[p]{a} \sqrt[q]{b} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}$$

b) Soient $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}^+$, déduire de ce qui précède :

$$\frac{a_1 b_1}{\sqrt[p]{a_1^p + a_2^p} \sqrt[q]{b_1^q + b_2^q}} \leq \frac{1}{p} \frac{a_1^p}{a_1^p + a_2^p} + \frac{1}{q} \frac{b_1^q}{b_1^q + b_2^q}$$

c) Conclure que

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 \leq \sqrt[p]{a_1^p + a_2^p} \sqrt[q]{b_1^q + b_2^q}$$

d) Plus généralement, établir que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ on a :

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n a_i^p} \sqrt[q]{\sum_{i=1}^n b_i^q}$$

Exercice 7 [01403] [correction]

a) Montrer que $x \mapsto \ln(1 + e^x)$ est convexe sur \mathbb{R}

b) Etablir

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^{+\ast}, 1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n (1 + x_k) \right)^{1/n}$$

c) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^*, a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}^{+\ast}$, l'inégalité :

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^n b_k \right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n (a_k + b_k) \right)^{1/n}$$

Exercice 8 X MP [02945] [correction]

Soient $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ des réels positifs.

Montrer que $(x_1 \dots x_n)^{1/n} + (y_1 \dots y_n)^{1/n} \leq ((x_1 + y_1) \times \dots \times (x_n + y_n))^{1/n}$.

Corrections

Exercice 1 : [énoncé]

a) La fonction $x \mapsto \sin x$ est concave sur $[0, \pi/2]$, la droite d'équation $y = x$ est sa tangente en 0 et la droite d'équation $y = \frac{2}{\pi}x$ est celle supportant la corde joignant les points d'abscisses 0 et $\pi/2$.

Le graphe d'une fonction concave est en dessous de ses tangentes et au dessus de ses cordes.

b) La fonction $x \mapsto x^{n+1}$ est convexe sur \mathbb{R}^+ et sa tangente en 1 a pour équation $y = (n+1)x - n$.

Le graphe d'une fonction convexe est au dessus de chacune de ses tangentes.

Exercice 2 : [énoncé]

f est définie et \mathcal{C}^∞ sur $]1, +\infty[$.

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln x} \text{ et } f''(x) = -\frac{\ln x + 1}{(x \ln x)^2} \leq 0$$

f est concave.

Puisque f est concave :

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

i.e.

$$\ln\left(\ln \frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\ln(\ln x) + \ln(\ln y)}{2} = \ln \sqrt{\ln x \ln y}$$

La fonction exp étant croissante :

$$\ln \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{\ln x \ln y}$$

Exercice 3 : [énoncé]

La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur \mathbb{R}^{+*} donc

$$f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}$$

d'où

$$\frac{n}{x_1 + \dots + x_n} \leq \frac{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}}{n}$$

puis l'inégalité voulue.

Exercice 4 : [énoncé]

La fonction $x \mapsto \ln x$ est concave. En appliquant l'inégalité de concavité entre a^p et b^q on obtient

$$\ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \geq \frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q$$

puis l'inégalité voulue.

Exercice 5 : [énoncé]

La propriété est immédiate pour $a = 0$ ou $b = 0$.

Supposons désormais $a, b > 0$.

Par concavité de la fonction logarithme, on peut affirmer

$$\ln(ta + (1-t)b) \geq t \ln a + (1-t) \ln b$$

et donc

$$\ln(a^t b^{1-t}) \leq \ln(ta + (1-t)b)$$

puis l'inégalité proposée en composant avec la fonction exponentielle qui est croissante.

Exercice 6 : [énoncé]

a) Par la concavité de $x \mapsto \ln x$, on a pour tout $a, b > 0$ et tout $\lambda \in [0, 1]$ l'inégalité :

$$\lambda \ln a + (1-\lambda) \ln b \leq \ln(\lambda a + (1-\lambda)b)$$

Appliquée à $\lambda = 1/p$, elle donne

$$\ln \sqrt[p]{a} \sqrt[q]{b} \leq \ln\left(\frac{a}{p} + \frac{b}{q}\right)$$

puis l'inégalité voulue. Enfin celle-ci reste vraie si $a = 0$ ou $b = 0$.

b) Il suffit d'appliquer l'inégalité précédente à

$$a = \frac{a_1^p}{a_1^p + a_2^p} \text{ et } b = \frac{b_1^q}{b_1^q + b_2^q}$$

c) De même on a aussi

$$\frac{a_2 b_2}{\sqrt[p]{a_1^p + a_2^p} \sqrt[q]{b_1^q + b_2^q}} \leq \frac{1}{p} \frac{a_2^p}{a_1^p + a_2^p} + \frac{1}{q} \frac{b_2^q}{b_1^q + b_2^q}$$

donc en sommant les inégalités obtenues puis en simplifiant on obtient celle voulue.

d) En reprenant l'inégalité du a) avec

$$a = \frac{a_j^p}{\sum_{i=1}^n a_i^p} \text{ et } b = \frac{b_j^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q}$$

puis en sommant les inégalités obtenues, on obtient celle voulue.

Exercice 7 : [énoncé]

a) $f : x \mapsto \ln(1 + e^x)$ est définie et C^∞ sur \mathbb{R} .

$$f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} = 1 - \frac{1}{1 + e^x} \text{ et } f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} \geq 0$$

f est donc convexe.

b)

$$f\left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right) \leq \frac{f(a_1) + \dots + f(a_n)}{n}$$

donne

$$\ln\left(1 + e^{\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}}\right) \leq \frac{1}{n} \ln\left(\prod_{k=1}^n 1 + e^{a_k}\right)$$

puis

$$1 + e^{\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}} \leq \left(\prod_{k=1}^n 1 + e^{a_k}\right)^{1/n}$$

qui donne l'inégalité voulue en partant de $a_k = \ln x_k$.

c) En factorisant

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^n b_k\right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} \left(1 + \left(\prod_{k=1}^n \frac{b_k}{a_k}\right)^{1/n}\right)$$

puis en vertu de ce qui précède

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^n b_k\right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} \left(\prod_{k=1}^n 1 + \frac{b_k}{a_k}\right)^{1/n}$$

puis

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^n b_k\right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n (a_k + b_k)\right)^{1/n}$$

Exercice 8 : [énoncé]

Si l'un des x_i ou des y_i est nul, la relation est immédiate. On suppose désormais $x_i, y_i > 0$.

En divisant par $(x_1 \dots x_n)^{1/n}$, la propriété demandée équivaut à

$1 + (\alpha_1 \dots \alpha_n)^{1/n} \leq ((1 + \alpha_1) \dots (1 + \alpha_n))^{1/n}$ pour tout $\alpha_i > 0$. Établissons cette identité.

Considérons la fonction $f : x \mapsto \ln(1 + e^x)$.

f est dérivable et $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} = 1 - \frac{1}{1 + e^x}$. La fonction f' est croissante donc f est convexe.

Par l'inégalité de Jensen : $\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}, f\left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right) \leq \frac{1}{n} (f(a_1) + \dots + f(a_n))$.

Pour $a_i = \ln \alpha_i$, on obtient

$$\ln\left(1 + e^{\frac{1}{n}(\ln \alpha_1 + \dots + \ln \alpha_n)}\right) \leq \frac{1}{n} (\ln(1 + \alpha_1) + \dots + \ln(1 + \alpha_n))$$

puis $\ln\left(1 + (\alpha_1 \dots \alpha_n)^{1/n}\right) \leq \ln\left((1 + \alpha_1) \dots (1 + \alpha_n)\right)^{1/n}$

et par la croissance de la fonction exponentielle, on obtient

$$1 + (\alpha_1 \dots \alpha_n)^{1/n} \leq ((1 + \alpha_1) \dots (1 + \alpha_n))^{1/n}.$$