

Intégration sur un intervalle quelconque

Intégrabilité

Exercice 1 [00657] [Correction]

Etudier l'existence des intégrales suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \int_0^1 \frac{dt}{(1-t)\sqrt{t}} & \text{b) } \int_0^{+\infty} \ln(t) e^{-t} dt & \text{c) } \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt \\ \text{d) } \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t)}{t^{3/2}} dt & \text{e) } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln(1+t^2)}{1+t^2} dt & \text{f) } \int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{t^2}\right) dt \end{array}$$

Exercice 2 [02349] [Correction]

Etudier l'existence des intégrales suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \int_0^{+\infty} \frac{t e^{-\sqrt{t}}}{1+t^2} dt & \text{b) } \int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{(1-t)^3}} dt & \text{c) } \int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t-1} \\ \text{d) } \int_0^{+\infty} e^{-(\ln t)^2} dt & \text{e) } \int_0^{+\infty} e^{-t \arctan t} dt & \text{f) } \int_0^{+\infty} t+2-\sqrt{t^2+4t+1} dt \end{array}$$

Exercice 3 [03385] [Correction]

a) Etudier l'intégrabilité sur $]1, +\infty[$ de

$$f(x) = \frac{\sqrt{\ln x}}{(x-1)\sqrt{x}}$$

b) Montrer

$$\int_2^3 f(x) dx \leq \frac{\ln 3}{2}$$

Exercice 4 [03221] [Correction]

Etudier l'existence de

$$\int_0^{+\infty} \ln(tht) dt$$

Exercice 5 [00661] [Correction]

Montrer que les fonctions $t \mapsto \sin t$ et $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ ne sont pas intégrables sur $[0, +\infty[$.

Exercice 6 [00183] [Correction]

Etudier l'intégrabilité en 0 de

$$f : x \mapsto \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$$

Exercice 7 [03206] [Correction]

Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue vérifiant

$$\forall x, a \geq 1, 0 \leq f(x) \leq \frac{a}{x^2} + \frac{1}{a^2}$$

La fonction f est-elle intégrable sur $[1, +\infty[$?

Exercice 8 [03441] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, positive et décroissante.

On pose $g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$g(x) = f(x) \sin x$$

Montrer que les intégrabilités de f et de g sont équivalentes.

Exercice 9 [03627] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et positive. On suppose

$$\frac{f(x+1)}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell \in [0, 1[$$

Déterminer la nature de $\int_0^{+\infty} f(t) dt$.

Exercice 10 [03442] [Correction]

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$f(x) = x^2 \cos(1/x^2) \text{ si } x \in]0, 1] \text{ et } f(0) = 0$$

Montrer que f est dérivable sur $[0, 1]$ mais que sa dérivée f' n'est pas intégrable sur $]0, 1]$.

Exercice 11 [01770] [Correction]

Soit g définie sur $\mathbb{R}^{+\ast}$ par

$$g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

où f est continue, de carré intégrable sur \mathbb{R}^+ .

- a) Etudier le prolongement par continuité de g en 0.
- b) Exprimer $g'(x)$ en fonction de $f(x)$ et de $g(x)$ pour $x > 0$.
- c) Pour $0 < a < b$, montrer que

$$\int_a^b g^2(t) dt = 2 \int_a^b f(t)g(t) dt + ag^2(a) - bg^2(b)$$

puis montrer que

$$\sqrt{\int_a^b g^2(t) dt} \leq \sqrt{\int_0^{+\infty} f^2(t) dt} + \sqrt{ag^2(a) + \int_0^{+\infty} f^2(t) dt}$$

- d) Etudier la nature de

$$\int_0^{+\infty} g^2(t) dt$$

Exercice 12 [03753] [Correction]

[Inégalité de Hardy]

Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et de carré intégrable. Pour $x > 0$, on pose

$$g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

- a) Montrer que g^2 est intégrable sur $]0, +\infty[$ et que

$$\int_0^{+\infty} g^2(t) dt \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(t) dt$$

- b) Montrer que fg est intégrable et

$$\int_0^{+\infty} g^2(t) dt = 2 \int_0^{+\infty} f(t)g(t) dt$$

Exercice 13 [03053] [Correction]

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que f et f'' sont de carrés intégrables.

- a) Montrer que f' est de carré intégrable.
- b) Montrer :

$$\left(\int_{\mathbb{R}} f'^2 \right)^2 \leq \left(\int_{\mathbb{R}} f^2 \right) \left(\int_{\mathbb{R}} f''^2 \right)$$

Intégrabilité dépendant de paramètres

Exercice 14 [00658] [Correction]

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur les paramètres réels a et b pour que les intégrales suivantes existent :

$$\text{a) } \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a(t-1)^b} \quad \text{b) } \int_0^{+\infty} \frac{t^a}{1+t^b} dt \quad \text{c) } \int_0^{+\infty} \frac{t^a e^{-t}}{1+t^b} dt$$

Exercice 15 [00659] [Correction]

[Intégrales de Bertrand]

Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ on étudie la nature de l'intégrale

$$\int_e^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$$

- a) On suppose $\alpha > 1$. Montrer que l'intégrale étudiée converge.
- b) On suppose $\alpha = 1$. Calculer

$$\int_e^x \frac{dt}{t(\ln t)^\beta}$$

et déterminer pour quels $\beta \in \mathbb{R}$ l'intégrale étudiée converge.

- c) On suppose $\alpha < 1$, en exploitant

$$\frac{t}{t^\alpha (\ln t)^\beta} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} +\infty$$

établir que l'intégrale étudiée diverge.

Exercice 16 [00660] [Correction]

Enoncer une condition nécessaire et suffisante sur $\alpha \in \mathbb{R}$ pour l'existence de

$$\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt$$

Exercice 17 [03705] [Correction]

a) a désigne un réel strictement supérieur à -1 . En posant $x = \tan t$, montrer

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+a \sin^2(t)} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+a}}$$

b) Donner en fonction de $\alpha > 0$, la nature de la série

$$\sum \int_0^\pi \frac{dt}{1 + (n\pi)^\alpha \sin^2(t)}$$

c) Même question pour

$$\sum \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1 + t^\alpha \sin^2(t)}$$

d) Donner la nature de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + t^\alpha \sin^2(t)}$$

Intégrabilité et comportement asymptotique

Exercice 18 [00662] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^1 telles que f et f' sont intégrables sur $[0, +\infty[$.
Montrer que f tend vers 0 en $+\infty$.

Exercice 19 [03440] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^1 .
On suppose que f^2 et f'^2 sont intégrables. Déterminer la limite de f en $+\infty$.

Exercice 20 [03231] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux.
On suppose que f est intégrable. Montrer

$$\int_x^{x+1} f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice 21 [00663] [Correction]

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, décroissante et intégrable sur \mathbb{R}^+ .

- Montrer que f tend vers zéro en $+\infty$.
- Montrer que $xf(x)$ tend vers zéro quand $x \rightarrow +\infty$
- Si on supprime l'hypothèse décroissante, déterminer un exemple de fonction f continue et intégrable sur \mathbb{R}^+ telle que f ne tend pas vers zéro en $+\infty$.

Exercice 22 [03232] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux et décroissante.
On suppose que f est intégrable. Montrer

$$xf(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice 23 [03238] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux et intégrable.
Montrer qu'il existe une suite (x_n) de réels positifs vérifiant

$$x_n \rightarrow +\infty \text{ et } x_n f(x_n) \rightarrow 0$$

Exercice 24 [02829] [Correction]

Donner un exemple de $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^+)$ intégrable et non bornée.

Exercice 25 [00572] [Correction]

Soit $f \in \mathcal{C}^2([0, +\infty[, \mathbb{R})$. On suppose que f et f'' sont intégrables.
a) Montrer que $f'(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.
b) Montrer que $f.f'$ est intégrable.

Exercice 26 [03901] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue de carré intégrable. Montrer

$$\int_0^x f(t) dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(\sqrt{x})$$

Calcul d'intégrales

Exercice 27 [00666] [Correction]

Calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t+1)(t+2)} & \text{b) } \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(e^t+1)(e^{-t}+1)} & \text{c) } \int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt \\ \text{d) } \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{t}} dt & \text{e) } \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt & \end{array}$$

Exercice 28 [02350] [Correction]

Calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{e^t + 1}} & \text{b) } \int_1^{+\infty} \frac{dt}{\text{sh}t} & \text{c) } \int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{(t^2 + 1)^2} dt \\ \text{d) } \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 \sqrt{1 + t^2}} & \text{e) } \int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{t}} dt & \end{array}$$

Exercice 29 [00667] [Correction]

Calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt & \text{b) } \int_0^{\pi/2} \sin x \ln(\sin x) dx & \text{c) } \int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} dt \\ \text{d) } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)\sqrt[3]{x}} & \text{e) } \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x(1+x)} dx & \text{f) } \int_0^{+\infty} \frac{(1+x)^{1/3}-1}{x(1+x)^{2/3}} dx \\ \text{g) } \int_0^{2\pi} \frac{dx}{2+\cos x} & \text{h) } \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2(x)}{3\cos^2(x)+1} dx & \text{i) } \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{x-x^2}} \end{array}$$

Exercice 30 [00670] [Correction]

a) Calculer

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{t dt}{1+t^4}$$

b) Etablir

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^4} = \int_0^{+\infty} \frac{t^2 dt}{1+t^4}$$

c) En factorisant $1+t^4$ déterminer la valeur de I .

Exercice 31 [03237] [Correction]

Justifier et calculer

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+it)}$$

Exercice 32 [00672] [Correction]

a) Justifier l'existence de

$$I = \int_0^1 \frac{t-1}{\ln t} dt$$

b) Etablir

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx$$

c) En séparant cette dernière intégrale en deux, observer

$$I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{2\varepsilon} \frac{e^{-x}}{x} dx$$

puis donner la valeur de I .

Exercice 33 [00676] [Correction]

a) Justifier l'existence de

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^2} dt$$

Pour $x > 0$, on pose

$$I(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^2} dt$$

b) On rappelle $\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a$. Etablir que

$$I(x) = \frac{3}{4} \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt$$

c) En déduire la valeur de I .

Exercice 34 [00673] [Correction]

[Intégrales d'Euler]

On pose

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt \text{ et } J = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t) dt$$

Montrer que les intégrales I et J sont bien définies et égales.

Calculer $I + J$ et en déduire les valeurs de I et J .

Exercice 35 [00675] [Correction]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell' \in \mathbb{R}$$

Justifier l'existence et donner la valeur de

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t+1) - f(t) dt$$

Exercice 36 [01334] [Correction]

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$ et $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ admettant une limite finie ℓ en $-\infty$ et telle que $\int_0^{+\infty} f$ existe.
Justifier l'existence, puis calculer :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f(a+x) - f(b+x)) dx$$

Exercice 37 [00677] [Correction]

Existence et valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(2x) - \arctan x}{x} dx$$

Exercice 38 [01333] [Correction]

Calculer

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4+x^8}$$

Exercice 39 [03375] [Correction]

a) Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1+x$$

En déduire

$$\forall t \in \mathbb{R}, 1-t^2 \leq e^{-t^2} \leq \frac{1}{1+t^2}$$

b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Etablir l'existence des intégrales suivantes

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt, I_n = \int_0^1 (1-t^2)^n dt \text{ et } J_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n}$$

puis établir

$$I_n \leq \frac{I}{\sqrt{n}} \leq J_n$$

c) On pose

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx$$

Etablir

$$I_n = W_{2n+1} \text{ et } J_{n+1} = W_{2n}$$

d) Trouver une relation de récurrence entre W_n et W_{n+2} .
En déduire la constance de la suite de terme général

$$u_n = (n+1)W_n W_{n+1}$$

e) Donner un équivalent de W_n et en déduire la valeur de I .

Exercice 40 [00525] [Correction]

Justifier l'existence et calculer

$$I = \int_0^{+\infty} t [1/t] dt$$

Exercice 41 [03630] [Correction]

Soit $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, décroissante et positive. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

Montrer que f est intégrable sur $]0, 1]$ si, et seulement si, la suite (S_n) est convergente et que si tel est le cas

$$\int_{]0,1]} f(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$$

Calcul d'intégrales comportant un paramètre

Exercice 42 [00683] [Correction]

Existence et valeur pour $a > 0$ de

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \sin(t)e^{-at} dt$$

Exercice 43 [00684] [Correction]

Soit $a > 0$. En procédant au changement de variable $u = a/t$, calculer

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2 + t^2} dt$$

Exercice 44 [02826] [Correction]

Calculer

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2 + a^2} dt$$

où $a > 0$.**Exercice 45** [00685] [Correction]Pour quelles valeurs de $a \in \mathbb{R}$, l'intégrale

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+t^a)}$$

est-elle définie ?

En procédant au changement de variable $u = 1/t$, montrer que $I(a) = \pi/4$.**Exercice 46** [03628] [Correction]Pour quelles valeurs de a et b l'intégrale suivante est-elle définie ?

$$\int_0^{+\infty} (\sqrt{t} + a\sqrt{t+1} + b\sqrt{t+2}) dt$$

La calculer lorsque c'est le cas.

Exercice 47 [00681] [Correction]Pour $a > 0$, calculer

$$I(a) = \int_0^{+\infty} (t - [t])e^{-at} dt$$

Exercice 48 [00686] [Correction]Soit f une fonction continue et croissante sur \mathbb{R} telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.a) Pour $a > 0$, montrer que l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} f(x+a) - f(x) dx$$

est définie et la calculer.

b) Calculer

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \arctan(x+a) - \arctan(x) dx$$

Exercice 49 [02827] [Correction]

Trouver une expression simple de

$$\int_0^\pi \frac{\sin^2 t}{(1-2x \cos t + x^2)(1-2y \cos t + y^2)} dt$$

où $x, y \in]-1, 1[$.**Exercice 50** [02825] [Correction]

Existence et calcul éventuel de

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+(t+ib)^2} dt$$

Exercice 51 [03884] [Correction]Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, étudier l'existence et déterminer l'éventuelle valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + \alpha x + 1}$$

Exercice 52 [00674] [Correction]Soient $p, q \in \mathbb{R}$ tel que $p^2 - 4q < 0$. Justifier et calculer

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + pt + q}$$

Exercice 53 [03222] [Correction]Pour $a, b > 0$, calculer

$$I(a, b) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(t^2 + a^2)(t^2 + b^2)}$$

Exercice 54 [02968] [Correction]Soient P et Q dans $\mathbb{R}[X]$, où Q ne s'annule pas sur \mathbb{R} et $\deg P \leq \deg Q - 2$.Exprimer $\int_{\mathbb{R}} P/Q$ à l'aide des coefficients intervenant dans la décomposition en éléments simple de P/Q .

Exercice 55 [03916] [Correction]

a) Soit z un nombre complexe non réel. Déterminer la limite quand $A \rightarrow +\infty$ de

$$\int_{-A}^A \frac{dt}{t-z}$$

b) Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ tels que $F = P/Q$ soit définie et intégrable sur \mathbb{R} . Pour a pôle de F , on note R_a le coefficient de $1/(X-a)$ dans la décomposition en éléments simples de F .

Calculer la somme des R_a pour a décrivant l'ensemble des pôles de F .

c) En déduire

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F = 2i\pi \sum_{a \in P^+} R_a$$

où P^+ désigne l'ensemble des pôles de F de partie imaginaire strictement positive.

d) Soient $m, n \in \mathbb{N}$ avec $n > m$. Calculer

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^{2m}}{1+x^{2n}} dx$$

Exercice 56 [03977] [Correction]

a) Montrer que

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \exp\left(-\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right)\right) dx$$

existe pour tout $a \in \mathbb{R}$.

b) Justifier que pour $a > 0$,

$$I(a) = \int_0^{\sqrt{a}} \exp\left(-\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right)\right) \left(1 + \frac{a}{x^2}\right) dx$$

c) En déduire la valeur de $I(a)$ pour $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 57 [04060] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que l'intégrale suivante converge :

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt$$

On se donne deux réels $0 < a < b$

a) Etablir que pour tout $x > 0$

$$\int_x^{+\infty} \frac{f(at) - f(bt)}{t} dt = \int_{ax}^{bx} \frac{f(t)}{t} dt$$

b) En déduire convergence et valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(at) - f(bt)}{t} dt$$

Changement de variable

Exercice 58 [03177] [Correction]

Calculer

$$I = \int_0^1 \frac{1+t^2}{1+t^4} dt$$

en procédant au changement de variable $t = e^{-x}$.

Exercice 59 [02509] [Correction]

a) Calculer

$$\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$$

en effectuant notamment le changement de variable $x = e^t$.

b) En déduire la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$$

Exercice 60 [00668] [Correction]

Existence et valeur de

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^2}$$

On pourra exploiter le changement de variable $u = 1/t$.

Exercice 61 [00669] [Correction]

a) Etablir

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^3+1} = \int_0^{+\infty} \frac{x}{x^3+1} dx$$

b) En déduire la valeur de I .

Exercice 62 [02824] [Correction]

Existence et calcul de

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan \theta} \, d\theta$$

Exercice 63 [02965] [Correction]

Calculer

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} \text{ et } \int_0^1 \sqrt{x(1-x)} \, dx$$

Exercice 64 [02978] [Correction]Soit $f : \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ intégrable. On pose

$$g : x \in \mathbb{R}^* \mapsto f(x - 1/x)$$

Montrer que g est intégrable sur \mathbb{R}^{-*} et \mathbb{R}^{+*} et que

$$\int_{-\infty}^0 g(x) \, dx + \int_0^{+\infty} g(x) \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx$$

Intégration par parties

Exercice 65 [00678] [Correction]Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} \, dt$$

Exercice 66 [00680] [Correction]Calculer pour $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n = \int_0^1 (x \ln x)^n \, dx$$

Exercice 67 [00679] [Correction]Existence et calcul pour $n \in \mathbb{N}$ de

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}}$$

Exercice 68 [02555] [Correction]

On considère

$$f : t \mapsto \frac{\ln t}{(1+t)^2}$$

a) Etudier l'intégrabilité de f sur $]0, 1]$ et $[1, +\infty[$.

b) Calculer

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2} \, dt \text{ et } \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{(1+t)^2} \, dt$$

Exercice 69 [00671] [Correction]

Calculer

$$\int_0^1 \frac{\ln(1-x^2)}{x^2} \, dx$$

Exercice 70 [03794] [Correction]

Convergence et calcul de

$$\int_0^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) \, dt$$

Exercice 71 [03629] [Correction]Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et intégrable. Montrer que les fonctions u et v suivantes sont intégrables sur $[1, +\infty[$ et que leurs intégrales y sont égales :

$$u(x) = \frac{1}{x^2} \int_1^x f(t) \, dt \text{ et } v(x) = \frac{f(x)}{x}$$

Exercice 72 [03443] [Correction]Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^1 et vérifiant $f(0) = 0$. Etablir

$$\forall x > 0, \int_0^x \left(\frac{f(t)}{t} \right)^2 \, dt \leq 2 \int_0^x \frac{f(t)f'(t)}{t} \, dt$$

en justifiant l'existence des intégrales écrites.

Exercice 73 [00665] [Correction]

Soit $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe \mathcal{C}^1 telle que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [(1+x^2)u(x)^2 + u'(x)^2] dx < +\infty$$

- a) Déterminer les limites de $x \mapsto xu(x)^2$ en $\pm\infty$.
- b) Etablir

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u'(x)^2 dx \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 u(x)^2 dx \geq \frac{1}{4} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} u(x)^2 dx \right)^2$$

Exercice 74 [03990] [Correction]

Existence et calcul de

$$I = \int_0^{+\infty} \ln \left(\frac{1+t^2}{t^2} \right) dt$$

Suites d'intégrales

Exercice 75 [03584] [Correction]

On pose

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} \text{ pour } n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

- a) Déterminer une suite de fonctions (f_n) telle que

$$I_n = \int_0^1 f_n(t) dt$$

- b) Déterminer deux réels a et b tels que

$$I_n = a + \frac{b}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \text{ quand } n \rightarrow +\infty$$

Exercice 76 [00682] [Correction]

On pose

$$J_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^3)^{n+1}}$$

- a) Calculer J_0 .
- b) Former une relation de récurrence engageant J_n et J_{n+1} .

- c) Etablir qu'il existe $A > 0$ tel que

$$J_n \sim \frac{A}{\sqrt[3]{n}}$$

Exercice 77 [00157] [Correction]

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \int_0^{+\infty} \frac{t - [t]}{t(t+n)} dt$$

où $[t]$ représente la partie entière de t .

- a) Justifier la bonne définition de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$.
- b) Montrer que pour tout $A > 0$

$$\int_0^A \frac{t - [t]}{t(t+n)} dt = \frac{1}{n} \left(\int_0^n \frac{t - [t]}{t} dt - \int_A^{A+n} \frac{t - [t]}{t} dt \right)$$

En déduire une nouvelle expression intégrale de u_n .

- c) On pose

$$v_n = nu_n$$

Montrer la convergence de la série de terme général

$$v_n - v_{n-1} - \frac{1}{2n}$$

- d) En déduire un équivalent de u_n .

Exercice 78 [02446] [Correction]

- a) Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$. Déterminer les limites des suites

$$\left(\int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right) \text{ et } \left(\int_a^b f(t) \cos(nt) dt \right)$$

- b) Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2nt) \cos t}{\sin t} dt$$

(on procédera par récurrence)

- c) En déduire

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

- d) Etudier la limite puis un équivalent de

$$\left(\int_0^{\pi/2} \ln(2 \sin(t/2)) \cos(nt) dt \right)$$

Intégrales seulement convergentes

Exercice 79 [02346] [Correction]

[Intégrale de Dirichlet]

Justifier la convergence de l'intégrale suivante

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

On peut montrer que celle-ci est égale à $\pi/2$ mais c'est une autre histoire...

Exercice 80 [02383] [Correction]

[Intégrale de Dirichlet]

Etablir

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$$

puis

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin t}{t}\right)^2 dt$$

On peut démontrer que cette valeur commune est $\pi/2$ mais c'est une autre histoire...

Exercice 81 [03178] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux, décroissante et de limite nulle.

Montrer la convergence de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} f(t) \sin(t) dt$$

Exercice 82 [03334] [Correction]

La fonction $x \mapsto \int_0^x \sin(e^t) dt$ admet-elle une limite en $+\infty$?

Exercice 83 [00694] [Correction]

[Intégrales de Fresnel]

Montrer la convergence des deux intégrales suivantes

$$\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt \text{ et } \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$$

Exercice 84 [02421] [Correction]

Convergence de

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{it^2} dt$$

Exercice 85 [03414] [Correction]

Trouver un équivalent en $+\infty$ de

$$f(\lambda) = \int_0^1 e^{i\lambda x^2} dx$$

Exercice 86 [00691] [Correction]

Pour $x > 0$, on pose

$$f(x) = \int_0^x e^{it^2} dt = \int_0^x \cos(t^2) dt + i \int_0^x \sin(t^2) dt$$

a) Montrer

$$f(x) = \frac{e^{ix^2} - 1}{2ix} + \frac{1}{2i} \int_0^x \frac{e^{it^2} - 1}{t^2} dt$$

En déduire que f admet une limite notée λ en $+\infty$.

b) On pose $g(x) = \lambda - f(x)$. Montrer que pour $x > 0$

$$g(x) = \frac{1}{2i} \int_x^{+\infty} \frac{e^{it^2}}{t^2} dt - \frac{e^{ix^2}}{2ix}$$

c) Montrer qu'au voisinage de $+\infty$

$$g(x) = -\frac{e^{ix^2}}{2ix} + O\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

Exercice 87 [00695] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue. On suppose que l'intégrale suivante converge :

$$\int_0^{+\infty} f(t) dt$$

Calculer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x t f(t) dt$$

Exercice 88 [03631] [Correction]

Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer

$$\int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ converge} \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt \text{ converge}$$

Exercice 89 [02378] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et $\alpha > 0$. Montrer

$$\int_0^{+\infty} f(t) dt \text{ converge} \Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{1+t^\alpha} dt \text{ converge}$$

Exercice 90 [00696] [Correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue.

On suppose que pour $s_0 \in \mathbb{R}$, l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-s_0 t} dt$ converge.

Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$ converge pour tout $s > s_0$.

Exercice 91 [03900] [Correction]

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ avec f de classe \mathcal{C}^1 , décroissante et de limite nulle en $+\infty$.

Soit $g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue telle qu'il existe $M \in \mathbb{R}^+$ vérifiant

$$\forall x \in [a, +\infty[, \left| \int_a^x g(t) dt \right| \leq M$$

Montrer la convergence de l'intégrale suivante

$$\int_a^{+\infty} f(t)g(t) dt$$

Etude d'intégrales dépendant d'un paramètre

Exercice 92 [00688] [Correction]

On pose pour

$$f(a) = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a + 1}$$

- a) Pour quelles valeurs de a , l'intégrale définissant $f(a)$ existe-t-elle?
- b) Montrer que la fonction est décroissante et de limite nulle en $+\infty$.

Exercice 93 [00687] [Correction]

[Fonction Γ d'Euler]

Pour $x > 0$ on note

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

- a) Montrer que cette dernière intégrale est bien définie pour tout $x > 0$.
- b) Justifier

$$\forall x > 1, \Gamma(x) = (x-1)\Gamma(x-1)$$

et calculer $\Gamma(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 94 [00689] [Correction]

a) Pour quelles valeurs de x , l'intégrale

$$f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt$$

est-elle définie ?

- b) Etudier la monotonie de f .
- c) Calculer

$$f(x) + f(x+1) \text{ pour } x > 0$$

- d) Déterminer la limite de f en $+\infty$ ainsi qu'un équivalent.
- e) Déterminer la limite de f en 0^+ ainsi qu'un équivalent.

Exercice 95 [00692] [Correction]

Soit $\varphi : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe \mathcal{C}^1 intégrable.

a) Soit $A > 0$. Montrer

$$\int_0^A \varphi(t) \cos(xt) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

b) Montrer

$$\int_0^{+\infty} \varphi(t) \cos(xt) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Intégrales fonctions des bornes

Exercice 96 [00690] [Correction]

Pour $x > 0$, on pose

$$F(x) = \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$$

- Montrer que $F(x)$ est bien définie pour tout $x > 0$.
- Etablir que F est de classe \mathcal{C}^1 sur $\mathbb{R}^{+\ast}$ et calculer $F'(x)$.
- Montrer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} xF(x) = 0$$

- Sans exprimer $F(x)$, justifier l'existence et calculer

$$\int_0^{+\infty} F(x) dx$$

Exercice 97 [02879] [Correction]

- Donner la nature de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

On pose pour tout réel x

$$f(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

- Montrer que f est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} et exprimer sa dérivée.
- Calculer

$$\int_0^{+\infty} f(t) dt$$

Exercice 98 [00281] [Correction]

Pour tout $x \in [1, +\infty[$, on pose

$$F(x) = \int_1^x \frac{t}{\sqrt{t^3 - 1}} dt$$

- Montrer que F est bien définie, continue sur $[1, +\infty[$ et de classe \mathcal{C}^∞ sur $]1, +\infty[$. Exprimer $F'(x)$.
- Etudier la dérivabilité de F en 1. Préciser la tangente au graphe de F en 1.

- Etudier la limite de F en $+\infty$.

- Justifier que F réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle à préciser et que F^{-1} est dérivable sur $]0, +\infty[$ et solution de l'équation différentielle

$$yy' = \sqrt{y^3 - 1}$$

- Etudier la dérivabilité de F^{-1} en 0.

Exercice 99 [02348] [Correction]

- Justifier que

$$G(x, y) = \int_0^y \frac{t - [t]}{t(t+x)} dt$$

où $[t]$ représente la partie entière de t , est définie sur $(\mathbb{R}^{+\ast})^2$.

- Montrer que $G(x, y)$ tend vers une limite $G(x)$ quand y tend vers $+\infty$.
- Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, G(n, y) = \frac{1}{n} \left(\int_0^n \frac{t - [t]}{t} dt - \int_y^{y+n} \frac{t - [t]}{t} dt \right)$$

- On note $H(n) = nG(n)$; montrer que la série de terme général

$$H(n) - H(n-1) - \frac{1}{2n}$$

converge et en déduire un équivalent de $G(n)$.

Intégration des relations de comparaison

Exercice 100 [03892] [Correction]

Déterminer un équivalent quand $x \rightarrow +\infty$ du terme

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

Exercice 101 [03893] [Correction]

Déterminer un équivalent quand $x \rightarrow +\infty$ du terme

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$$

Exercice 102 [03894] [\[Correction\]](#)

Déterminer un développement asymptotique à trois termes quand $x \rightarrow +\infty$ de l'expression

$$\int_1^x \frac{e^t}{t} dt$$

Exercice 103 [04059] [\[Correction\]](#)

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour $0 < a < b$, déterminer

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{ax}^{bx} \frac{f(t)}{t} dt$$

Exercice 104 [04067] [\[Correction\]](#)

Déterminer un équivalent quand $x \rightarrow +\infty$ de

$$\int_e^x \frac{dt}{\ln t}$$

Exercice 105 [04068] [\[Correction\]](#)

a) Justifier

$$\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} (\ln x)^2$$

b) Etablir qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ telle que

$$\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + C + \varepsilon(x) \text{ avec } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

c) Déterminer un équivalent de la fonction ε en $+\infty$

Exercice 106 [04075] [\[Correction\]](#)

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^{+*}$ de classe \mathcal{C}^1 et non intégrable. On suppose

$$f'(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(f(x)).$$

Montrer

$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\int_0^x f(t) dt\right)$$

Corrections

Exercice 1 : [énoncé]

On notera f la fonction intégrée et I l'intervalle d'étude, à chaque fois f s'avère continue par morceaux sur I .

a) $I =]0, 1[$, $f(t) \underset{t \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{1}{1-t}$ donc f n'est pas intégrable au voisinage de 1 et puisque de signe constant, l'intégrale étudiée diverge.

b) $I =]0, +\infty[$, $\sqrt{t}f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0$ et $t^2 f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ donc f est intégrable et

$\int_0^{+\infty} \ln t e^{-t} dt$ converge.

c) $I =]0, +\infty[$, $\sqrt{t}f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0$ et $t^{3/2}f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ donc f est intégrable et

$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt$ converge.

d) $I =]0, +\infty[$, $f(t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{\sqrt{t}}$ et $t^{4/3}f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ donc f est intégrable et

$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t)}{t^{3/2}} dt$ converge.

e) $I =]-\infty, +\infty[$, $t^{3/2}f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ et $|t|^{3/2}f(t) \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} 0$ donc f est intégrable

et $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln(1+t^2)}{1+t^2} dt$ converge.

f) $I =]0, +\infty[$, $\sin \frac{1}{t^2} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$ et $\sin \frac{1}{t^2}$ est bornée au voisinage de 0 donc f est

intégrable et $\int_0^{+\infty} \sin \frac{1}{t^2} dt$ converge.

Exercice 2 : [énoncé]

On notera f la fonction intégrée et I l'intervalle d'étude, à chaque fois f s'avère continue par morceaux sur I .

a) $I =]0, +\infty[$, $t^2 f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ donc f est intégrable et $\int_0^{+\infty} \frac{te^{-\sqrt{t}}}{1+t^2} dt$ converge.

b) $I =]0, 1[$, $\sqrt{t}f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0$ et $\frac{\ln t}{\sqrt{(1-t)^3}} \underset{t=1-u}{=} \frac{\ln(1-u)}{u^{3/2}} \underset{u \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{\sqrt{u}}$ donc f est intégrable

et $\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{(1-t)^3}} dt$ converge

c) $I =]0, +\infty[$, $\frac{1}{e^t-1} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{t}$ donc f n'est pas intégrable au voisinage de 0. Puisque de plus cette fonction est positive, on peut affirmer que l'intégrale diverge.

d) $I =]0, +\infty[$, $f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0$ et $t^2 f(t) = e^{2 \ln t - (\ln t)^2} = e^{\ln t(2 - \ln t)} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ donc f

est intégrable et $\int_0^{+\infty} e^{-(\ln t)^2} dt$ converge.

e) $I =]0, +\infty[$, $t^2 f(t) = e^{2 \ln t - t \arctan t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ donc f est intégrable et

$\int_0^{+\infty} e^{-t \arctan t} dt$ converge.

f) $I =]0, +\infty[$.

Quand $t \rightarrow +\infty$,

$$f(t) = t + 2 - t\sqrt{1 + \frac{4}{t} + \frac{1}{t^2}} = t + 2 - t\left(1 + \frac{2}{t} + \frac{1}{2t^2} - \frac{2}{t^2} + O(1/t^3)\right) \sim \frac{3}{2t}$$

f n'est pas intégrable en $+\infty$. Puisque de plus cette fonction est positive, on peut affirmer que l'intégrale diverge.

Exercice 3 : [énoncé]

a) La fonction f est définie et continue par morceaux sur $]1, +\infty[$.

Quand $x \rightarrow 1^+$,

$$f(x) \sim \frac{\sqrt{(x-1)}}{(x-1)} = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$

et quand $x \rightarrow +\infty$

$$f(x) \sim \frac{\sqrt{\ln x}}{x^{3/2}} = o\left(\frac{1}{x^{1,0001}}\right)$$

donc f est intégrable sur $]1, +\infty[$.

b) Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\int_2^3 \frac{\sqrt{\ln x}}{(x-1)\sqrt{x}} dx \leq \left(\int_2^3 \frac{dx}{(x-1)^2}\right)^{1/2} \left(\int_2^3 \frac{\ln x}{x} dx\right)^{1/2}$$

En calculant les intégrales introduites

$$\int_2^3 \frac{\sqrt{\ln x}}{(x-1)\sqrt{x}} dx \leq \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{1/2} \left(\frac{1}{2} [(\ln 3)^2 - (\ln 2)^2]\right)^{1/2} \leq \frac{\ln 3}{2}$$

Exercice 4 : [énoncé]

La fonction $f : t \mapsto \ln(tht)$ est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

Quand $t \rightarrow 0^+$, $tht \sim t \rightarrow 0 \neq 1$ donc $\ln(tht) \sim \ln t$ puis $\sqrt{t} \ln(tht) \sim \sqrt{t} \ln t \rightarrow 0$.

Quand $t \rightarrow +\infty$, $tht = 1 - \frac{2}{e^{2t}+1}$ donc $\ln(tht) \sim -2e^{-2t}$ puis $t^2 \ln(tht) \rightarrow 0$.

On en déduit que f est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Exercice 5 : [énoncé]

On a

$$\int_0^{n\pi} |\sin t| dt = \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin t| dt = n \int_0^\pi \sin(t) dt = 2n \rightarrow +\infty$$

et donc $t \mapsto \sin t$ n'est pas intégrable sur $[0, +\infty[$.

La fonction $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ est prolongeable par continuité en 0 et c'est ce prolongement qu'on considère pour étudier son intégrabilité sur $[0, +\infty[$.

$$\int_0^{n\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt = \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt$$

Or pour $k > 1$,

$$\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{|\sin t|}{k\pi} dt \geq \frac{2}{k\pi}$$

donc

$$\int_0^{n\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \sum_{k=1}^n \frac{2}{k\pi} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \rightarrow +\infty$$

Exercice 6 : [\[énoncé\]](#)

La fonction f est définie et continue sur $]0, 1]$.

Pour $x \in]0, 1]$, on peut écrire

$$f(x) = \int_1^x \frac{e^t - 1}{t} dt + \int_1^x \frac{dt}{t} = \int_1^x \frac{e^t - 1}{t} dt + \ln x$$

D'une part, la fonction $t \mapsto \frac{e^t - 1}{t}$ se prolonge par continuité en 0, elle est donc intégrable sur $]0, 1]$ et par suite la fonction

$$x \mapsto \int_1^x \frac{e^t - 1}{t} dt$$

est intégrable sur $]0, 1]$ car converge quand $x \rightarrow 0^+$.

D'autre part, il est bien connu que la fonction $x \mapsto \ln x$ est intégrable sur $]0, 1]$.

On en déduit que f est intégrable sur $]0, 1]$.

Exercice 7 : [\[énoncé\]](#)

Pour $a = x^\alpha$ avec $\alpha > 0$ on obtient

$$0 \leq f(x) \leq \frac{1}{x^{2-\alpha}} + \frac{1}{x^{2\alpha}}$$

En prenant $\alpha = 2/3$,

$$0 \leq f(x) \leq \frac{2}{x^{4/3}}$$

et donc, par comparaison de fonctions positives, f est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Exercice 8 : [\[énoncé\]](#)

Puisque $|g| \leq |f|$, l'intégrabilité de f entraîne celle de g .

Inversement, supposons g intégrable.

On a

$$\int_0^{n\pi} |f(t)| dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(t) dt$$

avec par décroissance de f

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(t) dt \leq \pi f(k\pi)$$

Parallèlement

$$\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |f(t)| |\sin(t)| dt \geq f(k\pi) \int_0^\pi \sin(t) dt = 2f(k\pi)$$

donc

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(t) dt \leq \frac{\pi}{2} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} f(t) |\sin(t)| dt$$

Ainsi

$$\int_0^{n\pi} |f(t)| dt \leq \int_0^\pi f(t) dt + \int_0^{(n-1)\pi} f(t) |\sin(t)| dt$$

et donc

$$\int_0^{n\pi} |f(t)| dt \leq \int_0^\pi f(t) dt + \int_0^{+\infty} |g(t)| dt$$

On peut alors affirmer que les intégrales de $|f|$ sur les segments inclus dans $[0, +\infty[$ sont majorées ce qui signifie que la fonction f est intégrable sur $[0, +\infty[$.

Exercice 9 : [\[énoncé\]](#)

Soit $q \in]\ell, 1[$. Il existe $A \in \mathbb{R}^+$ tel que

$$\forall x \geq A, \frac{f(x+1)}{f(x)} \leq q$$

et donc

$$\forall x \geq A, f(x+1) \leq qf(x)$$

On a alors

$$\int_A^{A+n} f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_A^{A+1} f(t+k) dt \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_A^{A+1} q^k f(t) dt = \int_A^{A+1} f(t) \sum_{k=0}^{n-1} q^k dt$$

et donc

$$\int_A^{A+n} f(t) dt \leq \frac{1}{1-q} \int_A^{A+1} f(t) dt = M$$

On en déduit que les intégrales sur $[A, A+n]$ de la fonction positive f sont majorées et donc f est intégrable sur $[A, A+\infty[$ puis sur $[0, +\infty[$.
L'intégrale étudiée est donc convergente.

Exercice 10 : [énoncé]

f est évidemment dérivable sur $]0, 1]$ avec

$$f'(x) = 2x \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) + \frac{2}{x} \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

et puisque

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = x \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$$

f est aussi dérivable en 0 avec $f'(0) = 0$.

La fonction $x \mapsto x \cos(1/x^2)$ est intégrable sur $]0, 1]$ car bornée.

En revanche, la fonction $g : x \mapsto \sin(1/x^2)/x$ n'est pas intégrable sur $]0, 1]$. En effet, par le changement de variable \mathcal{C}^1 bijectif $t = 1/x^2$, l'intégrabilité de g sur $]0, 1]$ équivaut à l'intégrabilité sur $[1, +\infty[$ de

$t \mapsto \sin(t)/t$ et cette dernière est connue comme étant fautive.

On en déduit que f' n'est pas intégrable sur $]0, 1]$.

Exercice 11 : [énoncé]

a) Soit F une primitive de la fonction continue f . On a

$$g(x) = \frac{1}{x} (F(x) - F(0)) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} F'(0) = f(0)$$

Ainsi on peut prolonger g par continuité en 0 en posant $g(0) = f(0)$.

b) Soit F une primitive de f (il en existe car f est continue).

On a

$$g(x) = \frac{1}{x} (F(x) - F(0))$$

On en déduit que g est dérivable sur $\mathbb{R}^{+\ast}$ et

$$g'(x) = -\frac{1}{x^2} (F(x) - F(0)) + \frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - g(x)}{x}$$

c) Par intégration par parties

$$\int_a^b g^2(t) dt = [tg^2(t)]_a^b - 2 \int_a^b tg'(t)g(t) dt$$

donc

$$\int_a^b g^2(t) dt = [tg^2(t)]_a^b - 2 \int_a^b (f(t) - g(t))g(t) dt$$

puis la relation proposée.

On en déduit par l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\int_a^b g^2(t) dt \leq 2 \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt} \sqrt{\int_a^b g^2(t) dt} + ag^2(a)$$

puis

$$\int_a^b g^2(t) dt - 2 \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt} \sqrt{\int_a^b g^2(t) dt} \leq ag^2(a)$$

en ajoutant un même terme de part et d'autre

$$\left(\sqrt{\int_a^b g^2(t) dt} - \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt} \right)^2 \leq ag^2(a) + \int_a^b f^2(t) dt$$

puis par la croissance de la fonction racine carrée

$$\sqrt{\int_a^b g^2(t) dt} - \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt} \leq \left| \sqrt{\int_a^b g^2(t) dt} - \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt} \right| \leq \sqrt{ag^2(a) + \int_a^b f^2(t) dt}$$

et enfin

$$\sqrt{\int_a^b g^2(t) dt} \leq \sqrt{\int_0^b f^2(t) dt} + \sqrt{ag^2(a) + \int_0^b f^2(t) dt} \leq \sqrt{\int_0^{+\infty} f^2(t) dt} + \sqrt{ag^2(a) + \int_0^{+\infty} f^2(t) dt}$$

d) En faisant tendre a vers 0, on obtient

$$\sqrt{\int_0^b g^2(t) dt} \leq 2 \sqrt{\int_0^{+\infty} f^2(t) dt}$$

et on en déduit que la fonction g^2 est intégrable sur \mathbb{R}^+ car les intégrales de g^2 sur les segments inclus dans \mathbb{R}^+ sont majorées.

Exercice 12 : [énoncé]

a) Introduisons F la primitive de f s'annulant en 0. Quand $x \rightarrow 0^+$

$$g(x) = \frac{F(x)}{x} = \frac{F(x) - F(0)}{x} \rightarrow F'(0) = f(0)$$

La fonction g est donc prolongeable par continuité en 0.

Par intégration par parties

$$\int_{\varepsilon}^A g^2(x) dx = \left[-\frac{1}{x} F^2(x) \right]_{\varepsilon}^A + 2 \int_{\varepsilon}^A g(x) f(x) dx$$

Quand $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$\frac{F^2(\varepsilon)}{\varepsilon} = \frac{F(\varepsilon)}{\varepsilon} \times F(\varepsilon) \rightarrow 0$$

et donc

$$\int_0^A g^2(x) dx = -\frac{F^2(A)}{A} + 2 \int_0^A g(x) f(x) dx$$

Par suite

$$\int_0^A g^2(x) dx \leq 2 \int_0^A g(x) f(x) dx$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\left(\int_0^A g^2(x) dx \right)^2 \leq 4 \left(\int_0^A g^2(x) dx \right) \left(\int_0^A f^2(x) dx \right)$$

et que le premier membre soit nul ou non

$$\left(\int_0^A g^2(x) dx \right) \leq 4 \left(\int_0^A f^2(x) dx \right) \leq 4 \left(\int_0^{+\infty} f^2(x) dx \right)$$

On en déduit que g^2 est intégrable et l'inégalité proposée.

b) Puisque

$$|fg| \leq (f^2 + g^2)/2$$

la fonction fg est intégrable et en vertu de l'intégration par parties précédente,

$$\frac{F^2(x)}{x} = 2 \int_0^x g(t) f(t) dt - \int_0^x g^2(t) dt$$

Il suffit alors d'établir

$$\frac{F^2(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

pour conclure.

On peut déjà affirmer que $F^2(x)/x$ admet une limite finie ℓ en $+\infty$ car les deux intégrales partielles de l'expression précédente convergent. Si cette limite n'est pas nulle alors

$$g^2(x) = \frac{F^2(x)}{x} \times \frac{1}{x} \sim \frac{\ell}{x}$$

et donc g^2 n'est pas intégrable.

On peut donc conclure que la limite ℓ est nulle.

Exercice 13 : [énoncé]

a) Par intégration par parties

$$\int_0^x f'(t)^2 dt = f'(x)f(x) - f'(0)f(0) - \int_0^x f(t)f''(t) dt$$

Puisque f et f'' sont de carrés intégrables, la fonction $f f''$ est intégrable.

Puisque f'^2 est positive, l'intégrale partielle

$$\int_0^x f'(t)^2 dt$$

converge ou tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Dans les deux cas

$$f'(x)f(x) = f'(0)f(0) + \int_0^x f'(t)^2 dt + \int_0^x f(t)f''(t) dt$$

admet une limite quand $x \rightarrow +\infty$.

Or

$$\int_0^x f'(t)f(t) dt = \frac{1}{2} (f(x)^2 - f(0)^2)$$

donc si $f'(x)f(x)$ ne tend pas vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$, l'intégrale précédente diverge et donc

$$\frac{1}{2} f(x)^2 \rightarrow +\infty$$

ce qui est incompatible avec l'intégrabilité de f^2 sur \mathbb{R} .

Ainsi

$$f'(x)f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

et on en déduit que f' est de carré intégrable sur \mathbb{R}^+ et

$$\int_0^{+\infty} f'(t)^2 dt = f'(0)f(0) - \int_0^{+\infty} f(t)f''(t) dt$$

L'étude sur \mathbb{R}^- est identique avec

$$\int_{-\infty}^0 f'(t)^2 dt = -f'(0)f(0) + \int_{-\infty}^0 f(t)f''(t) dt$$

b) Par ce qui précède

$$\int_{\mathbb{R}} f'^2 = - \int_{\mathbb{R}} f f''$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\left(\int_{\mathbb{R}} f'^2\right) \leq \left(\int_{\mathbb{R}} f^2\right) \left(\int_{\mathbb{R}} f''^2\right)$$

Exercice 14 : [énoncé]

a)

$$\frac{1}{t^a(t-1)^b} \underset{t \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{(t-1)^b}$$

et

$$\frac{1}{t^a(t-1)^b} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^{a+b}}$$

Donc $t \mapsto \frac{1}{t^a(t-1)^b}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ si, et seulement si, $b < 1$ et $a + b > 1$.

b)

$$\frac{t^a}{1+t^b} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \begin{cases} t^a & \text{si } b > 0 \\ t^a/2 & \text{si } b = 0 \\ t^{a-b} & \text{si } b < 0 \end{cases}$$

et

$$\frac{t^a}{1+t^b} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \begin{cases} t^{a-b} & \text{si } b > 0 \\ t^a/2 & \text{si } b = 0 \\ t^a & \text{si } b < 0 \end{cases}$$

Donc $t \mapsto \frac{t^a}{1+t^b}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ si, et seulement si :
dans le cas $b > 0$: $a > -1$ et $a - b < -1$.

dans le cas $b = 0$: jamais

dans le cas $b < 0$: $a - b > -1$ et $a < -1$.

c)

$$\frac{t^a e^{-t}}{1+t^b} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{t^a}{1+t^b} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \begin{cases} t^a & \text{si } b > 0 \\ t^a/2 & \text{si } b = 0 \\ t^{a-b} & \text{si } b < 0 \end{cases}$$

et

$$t^2 \frac{t^a e^{-t}}{1+t^b} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$$

Donc $t \mapsto \frac{t^a e^{-t}}{1+t^b}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ si, et seulement si, $(a > -1 \text{ et } b \geq 0)$ ou $(a - b > -1 \text{ et } b < 0)$.

Exercice 15 : [énoncé]

Posons $f(t) = 1/(t^\alpha(\ln t)^\beta)$ continue positive sur $[e, +\infty[$.

a) Si $\alpha > 1$ alors en introduisant $\gamma \in]1, \alpha[$ on a $t^\gamma f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ donc f est

intégrable et $\int_e^{+\infty} f(t) dt$ converge.

b) Si $\alpha = 1$ alors

$$\int_e^x \frac{dt}{t(\ln t)^\beta} = \int_1^{\ln x} \frac{du}{u^\beta}$$

donc $\int_e^{+\infty} f(t) dt$ converge si, et seulement si, $\beta > 1$.

c) Si $\alpha < 1$ alors $\frac{t}{t^\alpha(\ln t)^\beta} = \frac{t^{1-\alpha}}{(\ln t)^\beta} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$ donc il existe $A \geq e$ vérifiant

$\forall t \geq A, \frac{1}{t^\alpha(\ln t)^\beta} \geq \frac{1}{t}$. On a alors

$$\int_A^x \frac{dt}{t^\alpha(\ln t)^\beta} \geq \int_A^x \frac{dt}{t} = \ln x - \ln A \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

et donc $\int_e^{+\infty} f(t) dt$ diverge.

Exercice 16 : [énoncé]

$f : t \mapsto \frac{t - \sin t}{t^\alpha}$ est définie et continue sur $]0, +\infty[$.

Quand $t \rightarrow 0$, $f(t) \sim \frac{1}{6t^{\alpha-3}}$ donc $\int_0^1 f(t) dt$ est définie si, et seulement si, $\alpha - 3 < 1$ i.e. $\alpha < 4$.

Quand $t \rightarrow +\infty$, $f(t) \sim \frac{1}{t^{\alpha-1}}$ donc $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ est définie si, et seulement si, $\alpha - 1 > 1$ i.e. $\alpha > 2$.

Finalement $\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt$ est définie si, et seulement si, $\alpha \in]2, 4[$.

Exercice 17 : [énoncé]

a) L'intégrale étudiée est bien définie pour $a > -1$ en tant qu'intégrale d'une fonction définie et continue sur le segment $[0, \pi/2]$. Par le changement de variable proposé, qui est \mathcal{C}^1 strictement monotone, on obtient

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+a \sin^2(t)} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+(1+a)x^2}$$

En considérant $u = x\sqrt{1+a}$, on détermine une primitive de la fonction intégrée

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+(1+a)x^2} = \left[\frac{1}{\sqrt{1+a}} \arctan(\sqrt{1+ax}) \right]_0^{+\infty}$$

Finalement

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+a\sin^2(t)} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+a}}$$

b) Par la symétrie du graphe de fonction sinus en $\pi/2$, on peut directement affirmer

$$\int_0^\pi \frac{dt}{1+(n\pi)^\alpha \sin^2(t)} = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+(n\pi)^\alpha \sin^2(t)}$$

Le calcul qui précède donne alors

$$\int_0^\pi \frac{dt}{1+(n\pi)^\alpha \sin^2(t)} = \frac{\pi}{\sqrt{1+(n\pi)^\alpha}} \sim \frac{\pi^{1-\alpha/2}}{n^{\alpha/2}}$$

Par équivalence de séries à termes positifs, la série étudiée converge si, et seulement si, $\alpha > 2$.

c) Pour $t \in [n\pi, (n+1)\pi]$, on a

$$1+(n\pi)^\alpha \sin^2(t) \leq 1+t^\alpha \sin^2(t) \leq 1+((n+1)\pi)^\alpha \sin^2(t)$$

Puis en passant à l'inverse et en intégrant, on obtient l'encadrement

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1+((n+1)\pi)^\alpha \sin^2(t)} \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2(t)} \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1+(n\pi)^\alpha \sin^2(t)}$$

Par comparaison de séries à termes positifs, la convergence de la série étudiée équivaut à la convergence de la série précédente. La condition attendue est donc encore $\alpha > 2$.

d) Les sommes partielles de la série étudiée ci-dessus correspondent aux intégrales suivantes

$$\int_0^{n\pi} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2(t)}$$

La fonction intégrée étant positive et la suite de segments $[0, n\pi]$ étant croissante et de réunion \mathbb{R}^+ , la convergence de l'intégrale proposée entraîne la convergence de la série et inversement. On conclut que l'intégrale étudiée converge si, et seulement si, $\alpha > 2$.

Exercice 18 : [énoncé]

Puisque f est de classe \mathcal{C}^1 et que f' est intégrable sur $[0, +\infty[$, on a

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f'(t) dt$$

Ainsi la fonction f converge en $+\infty$.

De plus f est intégrable sur $[0, +\infty[$, la limite de f en $+\infty$ ne peut alors être autre que 0.

Exercice 19 : [énoncé]

Par l'inégalité

$$ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$$

on peut affirmer

$$|ff'| \leq \frac{1}{2}(f^2 + f'^2)$$

et assurer que la fonction ff' est intégrable sur $[0, +\infty[$. Or

$$\int_0^x ff'(t) dt = \frac{1}{2}(f(x))^2$$

donc f^2 converge quand $x \rightarrow +\infty$. Puisque la fonction f^2 est intégrable sur $[0, +\infty[$ et converge en $+\infty$, sa limite est nécessairement nulle et donc $f \xrightarrow{+\infty} 0$.

Exercice 20 : [énoncé]

Par la relation de Chasles

$$\int_x^{x+1} f(t) dt = \int_0^{x+1} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt$$

donc, quand $x \rightarrow +\infty$,

$$\int_x^{x+1} f(t) dt \rightarrow \int_0^{+\infty} f(t) dt - \int_0^{+\infty} f(t) dt = 0$$

Exercice 21 : [énoncé]

a) Pour $x \geq 1$, la décroissance de f donne

$$\int_x^{x+1} f(t) dt \leq f(x) \leq \int_{x-1}^x f(t) dt$$

Or

$$\int_x^{x+1} f(t) dt = \int_0^{x+1} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt$$

et puisque l'intégrale de f sur $[0, +\infty[$ converge

$$\int_x^{x+1} f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f(t) dt - \int_0^{+\infty} f(t) dt = 0$$

Aussi

$$\int_{x-1}^x f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

et donc par encadrement

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

b) La fonction f est positive car décroît vers 0 en $+\infty$ et

$$0 \leq \frac{x}{2} f(x) \leq \int_{x/2}^x f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

ce qui permet d'affirmer

$$xf(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

c) Soit f la fonction définie sur \mathbb{R}^+ par :

$$\forall x \in [0, 2[, f(x) = 0$$

et

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, \forall t \in [0, 1[, f(t+n) = \begin{cases} n^2 t & \text{si } t \in [0, 1/n^2] \\ n^2(2/n^2 - t) & \text{si } t \in [1/n^2, 2/n^2] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

f est continue sur \mathbb{R}^+ et

$$\int_0^n f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f(t) dt = \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{n-1} \leq 1$$

Puisque la suite $([0, n])_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante de segments de réunion \mathbb{R}^+ et que f est positive on peut affirmer que f est intégrable sur $[0, +\infty[$.

Exercice 22 : [énoncé]

Par la décroissance de f , on a

$$\int_x^{2x} f(t) dt \leq xf(x) \leq 2 \int_{x/2}^x f(t) dt$$

Or par convergence de l'intégrale

$$\int_x^{2x} f(t) dt = \int_0^{2x} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

et de même

$$\int_{x/2}^x f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

On en déduit par encadrement

$$xf(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice 23 : [énoncé]

Montrons pour commencer

$$\forall \varepsilon > 0, \forall A \in \mathbb{R}^+, \exists x \geq A, |xf(x)| \leq \varepsilon$$

Par l'absurde, supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ et $A \in \mathbb{R}^+$ vérifiant

$$\forall x \geq A, |xf(x)| \geq \varepsilon$$

on a alors au voisinage de $+\infty$

$$|f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{x}$$

ce qui est contradictoire avec l'intégrabilité de f .

Sachant

$$\forall \varepsilon > 0, \forall A \in \mathbb{R}^+, \exists x \geq A, |xf(x)| \leq \varepsilon$$

on peut construire une suite (x_n) solution en prenant $\varepsilon = 1/(n+1) > 0$, $A = n$ et en choisissant x_n vérifiant

$$x_n \geq n \text{ et } |x_n f(x_n)| \leq 1/(n+1)$$

Exercice 24 : [énoncé]

On peut prendre f nulle sur $[0, 1]$, puis pour chaque intervalle $[n, n+1]$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f affine par morceaux définie par les nœuds $f(n) = 0$, $f(n + \frac{1}{n^3}) = n$, $f(n + \frac{2}{n^3}) = 0$ et $f(n+1) = 0$ ce qui définit une fonction f positive continue vérifiant $\int_n^{n+1} f = \frac{1}{n^2}$ et donc intégrable sur \mathbb{R}^+ bien que non bornée.

Exercice 25 : [énoncé]

a) On a

$$f'(x) = f'(0) + \int_0^x f''(t) dt$$

donc $f'(x)$ admet une limite finie ℓ quand $x \rightarrow +\infty$.

Si $\ell > 0$ alors pour x assez grand $f'(x) \geq \ell/2$ puis $f(x) \geq \ell x/2 + m$ ce qui empêche la convergence de $\int_0^{+\infty} f(t) dt$.

Si $\ell < 0$ on obtient aussi une absurdité. Il reste donc $\ell = 0$.

b) Puisque la fonction f' est continue et converge en $+\infty$, cette fonction est bornée et donc $t \mapsto f(t)f'(t)$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.

Exercice 26 : [énoncé](#)

Soit $\varepsilon > 0$ et $A \in [0, +\infty[$ tel que

$$\int_A^{+\infty} f^2(t) dt \leq \varepsilon^2$$

On a

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^A f(t) dt + \frac{1}{\sqrt{x}} \int_A^x f(t) dt$$

D'une part, par l'inégalité de Cauchy Schwarz

$$\left| \int_A^x f(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_A^x 1 dt} \sqrt{\int_A^x f^2(t) dt} \leq \varepsilon \sqrt{x}$$

D'autre part, pour x assez grand

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \left| \int_0^A f(t) dt \right| = \frac{Cte}{\sqrt{x}} \leq \varepsilon$$

Ainsi, pour x assez grand

$$\left| \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^x f(t) dt \right| \leq 2\varepsilon$$

Exercice 27 : [énoncé](#)

On notera f la fonction intégrée et I l'intervalle d'étude, à chaque fois f s'avère continue par morceaux sur I .

a) $I = [0, +\infty[$, $f(t) \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2}$, donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t+1)(t+2)} = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+2} dt = \left[\ln \frac{t+1}{t+2} \right]_0^{+\infty} = \ln 2$$

b) $I = [0, +\infty[$, $t^2 f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(e^t + 1)(e^{-t} + 1)} \stackrel{u=e^t}{=} \int_1^{+\infty} \frac{du}{(u+1)^2} = \frac{1}{2}$$

c) $I =]0, +\infty[$, $\sqrt{t}f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$ et $f(t) \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2}$ donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

$$\int_{\varepsilon}^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) dt \stackrel{IPP}{=} [t \ln(1 + 1/t^2)]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2 dt}{1+t^2} = \pi$$

L'intégration par parties est justifiée par deux convergences.

d) $I = [0, +\infty[$, $t^2 f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

$$\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{t}} dt \stackrel{u=\sqrt{t}}{=} \int_0^{+\infty} 2ue^{-u} du \stackrel{IPP}{=} [-2ue^{-u}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2e^{-u} du = 2$$

L'intégration par parties est justifiée par deux convergences.

e) $I =]0, +\infty[$, $\sqrt{t}f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0$ et $t^{3/2}f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt \stackrel{u=1/t}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\ln 1/u}{u^2(1+1/u)^2} du = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln u}{(u+1)^2} du$$

donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt = 0$$

Exercice 28 : [énoncé](#)

On notera f la fonction intégrée et I l'intervalle d'étude, à chaque fois f s'avère continue par morceaux sur I .

a) $I = [0, +\infty[$, $t^2 f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, donc f est intégrable et $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{e^t+1}}$ converge.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{e^t+1}} \stackrel{u=\sqrt{e^t+1}}{=} \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{2 du}{u^2-1} = \left[\ln \frac{u-1}{u+1} \right]_{\sqrt{2}}^{+\infty} = \ln \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = 2 \ln(1+\sqrt{2})$$

b) $I = [1, +\infty[$, $t^2 f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, donc f est intégrable et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{\text{sh}t}$ converge.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{\text{sh}t} = \int_1^{+\infty} \frac{2dt}{e^t - e^{-t}} \stackrel{u=e^t}{=} \int_e^{+\infty} \frac{2du}{u^2-1} = \left[\ln \frac{u-1}{u+1} \right]_e^{+\infty} = \ln \frac{e+1}{e-1}$$

c) $I =]0, +\infty[$, $f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$ et $t^2 f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ donc f est intégrable et

$\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{(t^2+1)^2} dt$ converge.

$$\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{(t^2+1)^2} dt \stackrel{u=1/t}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\ln 1/u}{u^3(1+1/u^2)^2} du = \int_0^{+\infty} \frac{-u \ln u}{(u^2+1)^2} du$$

donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{(t^2 + 1)^2} dt = 0$$

d) $I = [1, +\infty[$, $t^2 f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$, donc f est intégrable et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 \sqrt{1+t^2}}$ converge.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 \sqrt{1+t^2}} \stackrel{t=\operatorname{sh} x}{=} \int_{\operatorname{argsh} 1}^{+\infty} \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = \int_{\operatorname{argsh} 1}^{+\infty} \frac{4 dx}{(e^x - e^{-x})^2} \stackrel{u=e^x}{=} \int_{1+\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{4 du}{u(u-1/u)^2}$$

donc

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 \sqrt{1+t^2}} = \int_{1+\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{4u du}{(u^2 - 1)^2} = \left[2 \frac{1}{1-u^2} \right]_{1+\sqrt{2}}^{+\infty} = 2 \frac{1}{(\sqrt{2} + 1)^2 - 1} = \sqrt{2} - 1$$

e) $I =]0, 1]$, $t^{2/3} f(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} 0$ donc f est intégrable et $\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{t}} dt$ converge.

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{t}} dt = \int_{u=\sqrt{t}}^1 4 \ln u du = [4u \ln u - 4u]_0^1 = -4$$

Exercice 29 : [énoncé]

a) $f : t \mapsto \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}}$ est définie et continue sur $]0, +\infty[$, $f(t) \sim \frac{1}{\sqrt{t}}$ et $t^2 f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$

donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

Via le changement de variable $u = \sqrt{t}$

$$I = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u} du = 2$$

b) $f : x \mapsto \sin x \ln(\sin x)$ est définie et continue sur $]0, \pi/2]$ et $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow 0]{} 0$ donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

Via le changement de variable $t = \cos x$

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1-x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1-x) + \ln(1+x) dx = \ln 2 - 1$$

c) $f : t \mapsto \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}}$ est définie et continue sur $]0, 1[$, $\sqrt{t} f(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$ et $f(t) \xrightarrow[t \rightarrow 1]{} 0$ donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

Via le changement de variable $u = \sqrt{1-t}$

$$I = - \int_1^0 2 \ln(1-u^2) du = \int_0^1 2 \ln(1-u^2) du$$

Or $\int_0^1 \ln(1-u^2) du = \int_0^1 \ln(1-u) du + \int_0^1 \ln(1+u) du = 2 \ln 2 - 2$, donc

$$I = 4 \ln 2 - 4$$

d) $f : x \mapsto \frac{1}{(x+1)\sqrt[3]{x}}$ est définie et continue sur $]0, +\infty[$, $f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{x^{1/3}}$ et $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x^{4/3}}$ donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

Via le changement de variable $t = \sqrt[3]{x}$, $x = t^3$, $dx = 3t^2 dt$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)\sqrt[3]{x}} = \int_0^{+\infty} \frac{3t^2 dt}{(t^3+1)t} = 3 \int_0^{+\infty} \frac{t dt}{t^3+1}$$

puis

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)\sqrt[3]{x}} = \left[\ln \frac{t+1}{\sqrt{t^2-t+1}} + \sqrt{3} \arctan \frac{2t-1}{\sqrt{3}} \right]_0^{+\infty} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

e) $f : x \mapsto \frac{\sqrt{1+x}-1}{x(1+x)}$ est définie et continue sur $]0, +\infty[$, $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow 0^+]{} \frac{1}{2}$ et $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x^{3/2}}$ donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

Via le changement de variable $t = \sqrt{1+x}$, $x = t^2 - 1$, $dx = 2t dt$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x(1+x)} dx = \int_1^{+\infty} \frac{t-1}{(t^2-1)t^2} 2t dt = \int_1^{+\infty} \frac{2 dt}{t(t+1)} = 2 \ln 2$$

f) $f : x \mapsto \frac{(1+x)^{1/3}-1}{x(1+x)^{2/3}}$ est définie et continue sur $]0, +\infty[$, $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow 0^+]{} \frac{1}{3}$ et $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x^{4/3}}$ donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

Via le changement de variable $t = (1+x)^{1/3}$, $x = t^3 - 1$, $dx = 3t^2 dt$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{(1+x)^{1/3}-1}{x(1+x)^{2/3}} dx = 3 \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2+t+1}$$

or

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2+t+1} = \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}} \right]_1^{+\infty} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{(1+x)^{1/3}-1}{x(1+x)^{2/3}} dx = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

g) Par 2π périodicité,

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{2+\cos x} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{2+\cos x}$$

Sur $]-\pi, \pi[$, on peut réaliser le changement de variable $t = \tan x/2$.

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{2 + \cos x} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2dt}{(1+t^2)(2 + \frac{1-t^2}{1+t^2})} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2dt}{3+t^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

h) Sur $[0, \pi/2[,]\pi/2, 3\pi/2[$ ou $]3\pi/2, 2\pi[$ on a

$$\int \frac{\sin^2 x}{3 \cos^2 x + 1} dx \stackrel{t=\tan x}{=} \int \frac{t^2 dt}{(1+t^2)(4+t^2)} = -\frac{x}{3} + \frac{2}{3} \arctan \frac{\tan x}{2} + C^{te}$$

Par recollement, on détermine une primitive sur $[0, 2\pi]$ et on conclut

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2(x)}{3 \cos^2(x) + 1} dx = \frac{2\pi}{3}$$

i) $f : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x-x^2}}$ est définie et continue sur $]0, 1[$, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$ et $f(x) \sim \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge
On écrit

$$x - x^2 = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$$

On pose alors $x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sin t$ et on a $\sqrt{x-x^2} = \frac{1}{2} \cos t$.

Par changement de variable

$$\int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{x-x^2}} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin t + 1}{2 \cos t} \cos t dt = \frac{\pi}{2}$$

Exercice 30 : [énoncé]

a) $f : t \mapsto \frac{t}{1+t^4}$ est définie et continue sur $[0, +\infty[$, $f(t) \sim \frac{1}{t^3}$ donc f est intégrable et l'intégrale J converge.

$$\int_0^{+\infty} \frac{t dt}{1+t^4} = \left[\frac{1}{2} \arctan t^2 \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}$$

b) $\frac{1}{1+t^4} \sim \frac{1}{t^4}$ et $\frac{t^2}{1+t^4} \sim \frac{1}{t^2}$ donc les deux intégrales introduites convergent.

Le changement de variable $x = 1/t$ transforme l'une en l'autre.

c) On a la factorisation

$$t^4 + 1 = (t^2 + 1)^2 - 2t^2 = (t^2 + \sqrt{2}t + 1)(t^2 - \sqrt{2}t + 1)$$

donc

$$I - \sqrt{2}J + I = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + \sqrt{2}t + 1} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\left(t + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{1}{2}} = \left[\sqrt{2} \arctan(\sqrt{2}t + 1) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \quad I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx - \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{e^{-2x}}{x} dx$$

puis

$$I = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}} + \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

Exercice 31 : [énoncé]

La fonction intégrée est définie et continue par morceaux sur \mathbb{R} et est dominée par $1/t^3$ quand $|t| \rightarrow +\infty$, donc elle est intégrable et l'intégrale étudiée existe.

Par découpage et changement de variable

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+it)} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+it)} + \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1-it)}$$

donc

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+it)} = \int_0^{+\infty} \frac{2dt}{(1+t^2)^2}$$

Or

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)} - \int_0^{+\infty} \frac{t^2 dt}{(1+t^2)^2}$$

Une intégration par parties justifiée par deux convergences donne

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^2 dt}{(1+t^2)^2} = \left[-\frac{1}{2} \frac{t}{1+t^2} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$$

et donc

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+it)} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$$

Exercice 32 : [énoncé]

a) $f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \frac{t-1}{\ln t}$ est continue. $f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0$ et $f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 1^-} 1$

donc f est prolongeable par continuité à $[0, 1]$.

b) Via le changement de variable $t = e^{-x}$,

$$\int_0^1 \frac{t-1}{\ln t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx$$

c) Par linéarité (avec existence des intégrales introduites)

Par le changement de variable $t = 2x$

$$\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{e^{-2x}}{x} dx = \int_{2\varepsilon}^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$$

puis par la relation de Chasles

$$I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{2\varepsilon} \frac{e^{-x}}{x} dx$$

Puisque

$$\int_{\varepsilon}^{2\varepsilon} \frac{e^{-2\varepsilon}}{x} dx \leq \int_{\varepsilon}^{2\varepsilon} \frac{e^{-x}}{x} dx \leq \int_{\varepsilon}^{2\varepsilon} \frac{e^{-\varepsilon}}{x} dx$$

on a

$$e^{-2\varepsilon} \ln 2 \leq \int_{\varepsilon}^{2\varepsilon} \frac{e^{-x}}{x} dx \leq e^{-\varepsilon} \ln 2$$

puis à la limite : $I = \ln 2$.

Exercice 33 : [énoncé]

a) $f : t \mapsto \frac{\sin^3 t}{t^2}$ est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

Quand $t \rightarrow 0$, $f(t) \rightarrow 0$ et quand $t \rightarrow +\infty$, $f(t) = O(1/t^2)$.

On en déduit que f est intégrable sur I ce qui assure l'existence de I .

b) On a $\sin 3t = 3 \sin t - 4 \sin^3 t$ donc

$$4I(x) = \int_x^{+\infty} \frac{3 \sin t - \sin(3t)}{t^2} dt$$

Par convergence des intégrales écrites, on a

$$4I(x) = 3 \int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2} dt - \int_x^{+\infty} \frac{\sin(3t)}{t^2} dt$$

Or

$$\int_x^{+\infty} \frac{\sin(3t)}{t^2} dt \stackrel{u=3t}{=} 3 \int_{3x}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^2} du$$

donc

$$I(x) = \frac{3}{4} \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt$$

c) $I = \lim_{x \rightarrow 0} I(x)$. Or $\sin t = t + t^2 \varepsilon(t)$ avec $\varepsilon \rightarrow 0$ donc

$$\int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt = \ln 3 + \int_x^{3x} \varepsilon(t) dt$$

Puisque $\int_x^{3x} \varepsilon(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, on obtient

$$I = \frac{3}{4} \ln 3$$

Exercice 34 : [énoncé]

Puisque

$$\sqrt{t} \ln(\sin t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

l'intégrale I converge.

Par le changement de variable $t = \pi/2 - h$, I est transformée en J donc J converge et $I = J$.

$$I + J = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) + \ln(\cos t) dt = \int_0^{\pi/2} \ln\left(\frac{1}{2} \sin 2t\right) dt$$

puis

$$I + J = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t) - \ln 2 dt = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t) dt - \frac{\pi \ln 2}{2}$$

Cependant

$$2 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t) dt \stackrel{u=2t}{=} \int_0^{\pi} \ln(\sin u) du = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin u) du + \int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin u) du$$

et

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin u) du \stackrel{u=\pi/2+v}{=} \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(v + \pi/2)) dv = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos v) dv$$

donc

$$2 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t) dt = (I + J)$$

Par suite

$$I = J = -\frac{\pi \ln 2}{2}$$

Exercice 35 : [énoncé]

On a

$$\int_0^x f(t+1) - f(t) dt = \int_x^{x+1} f(t) dt - \int_0^1 f(t) dt$$

Etudions la limite de $\int_x^{x+1} f(t) dt$ quand $x \rightarrow +\infty$.

$$\left| \int_x^{x+1} f(t) dt - \ell \right| \leq \int_x^{x+1} |f(t) - \ell| dt$$

Pour $\varepsilon > 0$, il existe $A \in \mathbb{R}^+$, tel que pour $x \geq A$, $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$.
 Pour tout $t \in [x, x+1]$, on a alors $|f(t) - \ell| \leq \varepsilon$ puis par intégration

$$\left| \int_x^{x+1} f(t) dt - \ell \right| \leq \int_x^{x+1} |f(t) - \ell| dt \leq \varepsilon$$

Ainsi

$$\int_x^{x+1} f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$$

Finalement $\int_0^{+\infty} f(t+1) - f(t) dt$ converge et vaut $\ell - \int_0^1 f(t) dt$.
 Une étude semblable donne $\int_{-\infty}^0 f(t+1) - f(t) dt$ converge et vaut $\int_0^1 f(t) dt - \ell'$.
 Finalement $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t+1) - f(t) dt$ converge et vaut $\ell - \ell'$.

Exercice 36 : [énoncé]

Puisque l'intégrale $\int_0^{+\infty} f$ converge, il en est de même de

$$\int_0^{+\infty} f(a+x) dx \text{ et } \int_0^{+\infty} f(b+x) dx$$

avec

$$\int_0^{+\infty} f(a+x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ et } \int_0^{+\infty} f(b+x) dx = \int_b^{+\infty} f(x) dx$$

On en déduit la convergence de l'intégrale suivante et sa valeur

$$\int_0^{+\infty} (f(a+x) - f(b+x)) dx = \int_a^b f(x) dx$$

D'autre part, on a par découpage et pour tout $A \geq 0$

$$\int_{-A}^0 (f(a+x) - f(b+x)) dx = \int_{-A+a}^{-A+b} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx$$

Or

$$(b-a) \min_{[-A+a, -A+b]} f \leq \int_{-A+a}^{-A+b} f(x) dx \leq (b-a) \max_{[-A+a, -A+b]} f$$

avec

$$\min_{[-A+a, -A+b]} f \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \ell \text{ et } \max_{[-A+a, -A+b]} f \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \ell$$

car f converge vers ℓ en $-\infty$.

On en déduit la convergence et la valeur de l'intégrale suivante

$$\int_{-\infty}^0 (f(a+x) - f(b+x)) dx = (b-a)\ell - \int_a^b f(x) dx$$

et finalement on obtient la convergence et la valeur de l'intégrale suivante

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f(a+x) - f(b+x)) dx = (b-a)\ell$$

Exercice 37 : [énoncé]

La fonction $f : x \mapsto \frac{\arctan(2x) - \arctan x}{x}$ est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

Quand $x \rightarrow 0^+$,

$$f(x) = \frac{2x - x + o(x)}{x} \rightarrow 1$$

Quand $x \rightarrow +\infty$,

$$f(x) = \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{2x} - \frac{\pi}{2} + \arctan \frac{1}{x}}{x} = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

Ainsi f est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Pour $A \geq 0$,

$$\int_0^A \frac{\arctan(2x) - \arctan x}{x} dx = \int_0^A \frac{\arctan(2x)}{x} dx - \int_0^A \frac{\arctan x}{x} dx$$

avec convergence des deux nouvelles intégrale.

Par changement de variable $u = 2x$ sur la première,

$$\int_0^A \frac{\arctan(2x) - \arctan x}{x} dx = \int_0^{2A} \frac{\arctan x}{x} dx - \int_0^A \frac{\arctan x}{x} dx = \int_A^{2A} \frac{\arctan x}{x} dx$$

Par la croissance de la fonction arctan,

$$\arctan(A) \int_A^{2A} \frac{dx}{x} \leq \int_A^{2A} \frac{\arctan x}{x} dx \leq \arctan(2A) \int_A^{2A} \frac{dx}{x}$$

A la limite quand $A \rightarrow +\infty$, on conclut

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(2x) - \arctan x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \ln 2$$

Exercice 38 : [énoncé]

On a

$$\frac{1}{1 + X^4 + X^8} = \frac{1 - X^4}{1 - X^{12}}$$

Les pôles de cette fraction rationnelle sont les éléments de $U_{12} \setminus U_4$ et ils sont simples.

On peut donc écrire en combinant les parties polaires conjuguées

$$\frac{1}{1 + X^4 + X^8} = 2\operatorname{Re} \left(\frac{\alpha_1}{X - \omega_1} \right) + 2\operatorname{Re} \left(\frac{\alpha_2}{X - \omega_2} \right) + 2\operatorname{Re} \left(\frac{\alpha_4}{X - \omega_4} \right) + 2\operatorname{Re} \left(\frac{\alpha_5}{X - \omega_5} \right)$$

avec $\omega_k = \exp(2ik\pi/12)$, les $\omega_1, \omega_2, \omega_4$ et ω_5 de parties imaginaires strictement positives.

$$\alpha_k = \frac{1 - X^4}{(1 - X^{12})'} \Big|_{X=\omega_k} = \frac{1}{12} (\omega_k^5 - \omega_k)$$

Soit $\omega = a + ib \in \mathbb{C}$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b > 0$. On a

$$\int_{-A}^A \frac{dt}{t - \omega} = \int_{-A}^A \frac{(t - a) + ib}{(t - a)^2 + b^2} dt = \left[\frac{1}{2} \ln((t - a)^2 + b^2) + i \arctan \frac{t - a}{b} \right]_{-A}^A \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} i\pi$$

la limite de l'arc tangente étant obtenue sachant $b > 0$.

Soit de plus $\alpha \in \mathbb{C}$.

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\int_{-A}^A 2\operatorname{Re} \left(\frac{\alpha}{t - \omega} \right) dt \right) = 2\operatorname{Re} \left(\lim_{A \rightarrow +\infty} \alpha \int_{-A}^A \frac{dt}{t - \omega} \right) = -2\pi \operatorname{Im} \alpha$$

Puisque la convergence de l'intégrale que nous étudions est assurée

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^4 + x^8} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \frac{dx}{1 + x^4 + x^8}$$

et on en déduit

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^4 + x^8} = -2\pi \operatorname{Im} (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 + \alpha_5)$$

ce qui donne

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^4 + x^8} = \frac{\pi}{6} \operatorname{Im} (\omega^2 - \omega^{10} + \omega^4 - \omega^8)$$

Or

$$\omega^2 - \omega^{10} = 2i \sin \frac{\pi}{3} = i\sqrt{3} \text{ et } \omega^4 - \omega^8 = 2i \sin \frac{2\pi}{3} = i\sqrt{3}$$

et finalement

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^4 + x^8} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

Exercice 39 : [énoncé]

a) Il suffit d'étudier la variation de la fonction $x \mapsto e^x - (1 + x)$ pour obtenir cette inégalité de convexité classique. On en déduit

$$1 - t^2 \leq e^{-t^2} = \frac{1}{e^{t^2}} \leq \frac{1}{1 + t^2}$$

b) La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ est définie et continue par morceaux sur $[0, +\infty[$. Puisque $t^2 e^{-t^2} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, cette fonction est intégrable sur $[0, +\infty[$ ce qui assure l'existence de I .

La fonction $t \mapsto (1 - t^2)^n$ est définie et continue par morceaux sur le segment $[0, 1]$, donc l'intégrale définissant I_n existe.

La fonction $t \mapsto 1/(1 + t^2)^n$ est définie et continue par morceaux sur $[0, +\infty[$. Puisque $1/(1 + t^2)^n \sim 1/t^{2n}$ avec $2n > 1$, cette fonction est intégrable sur $[0, +\infty[$ ce qui assure l'existence de J_n .

On a

$$(1 - t^2)^n \leq e^{-nt^2} \leq \frac{1}{(1 + t^2)^n}$$

donc

$$I_n \leq \int_0^1 e^{-nt^2} dt = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-y^2} dy \leq \frac{I}{\sqrt{n}}$$

et

$$\frac{I}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx \leq J_n$$

c) Le changement de variable $t = \sin x$ donne $I_n = W_{2n+1}$.

Le changement de variable $t = \tan x$ donne $J_{n+1} = W_{2n}$.

d) Par intégration par parties

$$W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$$

On en déduit $u_{n+1} = u_n$ donc la suite (u_n) est constante égale à

$$u_1 = \pi/2$$

e) Puisque

$$\forall x \in [0, \pi/2], (\cos x)^{n+1} \leq (\cos x)^n \leq (\cos x)^{n-1}$$

on obtient en intégrant

$$W_{n+1} \leq W_n \leq W_{n-1}$$

Or

$$W_{n+1} = \frac{n}{n+1} W_{n-1} \sim W_{n-1}$$

donc par encadrement

$$W_{n+1} \sim W_n$$

On en déduit

$$u_n \sim nW_n^2$$

puis

$$W_n \sim \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2n}}$$

Par suite

$$I_n \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} \text{ et } J_n \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}$$

L'encadrement du b) donne alors

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Exercice 40 : [énoncé]

La fonction $f : t \mapsto t[1/t]$ est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

Pour $t > 1$, $[1/t] = 0$ et donc $f(t) = 0$. Ainsi f est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Pour $t > 0$, $1/t - 1 \leq [1/t] \leq 1/t$ et donc $f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 1$. Ainsi f est intégrable sur $]0, 1]$.

On a

$$I = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{1/n}^1 f(t) dt$$

Or

$$\int_{1/n}^1 f(t) dt = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{1/(k+1)}^{1/k} t[1/t] dt = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{1/(k+1)}^{1/k} kt dt$$

puis

$$\int_{1/n}^1 f(t) dt = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2k+1}{k(k+1)^2}$$

Par décomposition en éléments simples

$$\int_{1/n}^1 f(t) dt = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{(k+1)^2} \right)$$

et après réorganisation

$$\int_{1/n}^1 f(t) dt = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$$

On en déduit

$$I = \frac{\pi^2}{12}$$

Exercice 41 : [énoncé]

Supposons f intégrable sur $]0, 1]$.

Par la décroissance de f , on remarque

$$\int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t) dt \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{(k-1)/n}^{k/n} f(t) dt$$

En sommant pour k allant de 1 à $n-1$, on obtient

$$\int_{1/n}^1 f(t) dt \leq S_n - \frac{1}{n} f(1) \leq \int_0^{1-1/n} f(t) dt$$

Par théorème d'encadrement, on obtient

$$S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) dt$$

Inversement, supposons la suite (S_n) convergente.

Par la décroissance de f , on a

$$\int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t) dt \leq f\left(\frac{k}{n}\right)$$

En sommant pour k allant de 1 à $n-1$, on obtient

$$\int_{1/n}^1 f(t) dt \leq S_n - \frac{1}{n} f(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$$

On en déduit que la suite des intégrales précédente est majorée et puisque la fonction f est positive, cela suffit pour conclure que l'intégrale de f converge.

Exercice 42 : [énoncé]

Comme $a > 0$, $t^2 \sin t e^{-at} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, la fonction continue par morceaux

$t \mapsto \sin(t)e^{-at}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ et $I(a) = \int_0^{+\infty} \sin(t)e^{-at} dt$ converge.

$$I(a) = \text{Im} \left(\int_0^{+\infty} e^{it-at} dt \right) = \text{Im} \left(\left[\frac{1}{i-a} e^{it-at} \right]_0^{+\infty} \right) = \frac{1}{a^2 + 1}$$

Exercice 43 : [énoncé]

La fonction $t \mapsto \frac{\ln t}{a^2+t^2}$ est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$. Cette fonction est intégrable car

$$\sqrt{t} \frac{\ln t}{a^2+t^2} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0 \text{ et } t^{3/2} \frac{\ln t}{a^2+t^2} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$$

L'intégrale définissant $I(a)$ est donc bien définie.

Par le changement de variable \mathcal{C}^1 bijectif proposé

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2+t^2} dt = \int_{u=a/t}^{+\infty} \frac{\ln a - \ln u}{a(u^2+1)} du = \frac{\ln a}{a} \int_0^{+\infty} \frac{du}{u^2+1} - \frac{1}{a} I(1)$$

Pour $a = 1$, on obtient $I(1) = 0$ et donc

$$I(a) = \frac{\ln a}{a} \frac{\pi}{2}$$

Exercice 44 : [énoncé]

L'intégrabilité est entendue.

Par le changement de variable $u = a^2/t$ on obtient

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+a^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{2 \ln a - \ln u}{a^2+u^2} du$$

donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+a^2} dt = \frac{\pi}{2a} \ln a$$

Exercice 45 : [énoncé]

1ère méthode :

La fonction $t \mapsto \frac{1}{(1+t^2)(1+t^a)}$ est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

Quand $t \rightarrow +\infty$

$$\frac{1}{(1+t^2)(1+t^a)} \sim \begin{cases} 1/t^{a+2} & \text{si } a > 0 \\ 1/2t^2 & \text{si } a = 0 \\ 1/t^2 & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

donc la fonction $t \mapsto \frac{1}{(1+t^2)(1+t^a)}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Quand $t \rightarrow 0^+$

$$\frac{1}{(1+t^2)(1+t^a)} \rightarrow \begin{cases} 1 & \text{si } a > 0 \\ 1/2 & \text{si } a = 0 \\ 0 & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

donc la fonction $t \mapsto \frac{1}{(1+t^2)(1+t^a)}$ est intégrable sur $]0, 1]$.

Finalement $I(a)$ est définie pour tout $a \in \mathbb{R}$.

2ème méthode :

Comme

$$0 \leq \frac{1}{(1+t^2)(1+t^a)} \leq \frac{1}{1+t^2}$$

avec la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$, on peut affirmer que par comparaison de fonctions positives $t \mapsto \frac{1}{(1+t^2)(1+t^a)}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ et $I(a)$ converge.

Les deux intégrales étant bien définies :

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+t^a)} = \int_0^{+\infty} \frac{u^a du}{(1+u^2)(1+u^a)}$$

Par suite

$$2I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{(1+t^a)dt}{(1+t^2)(1+t^a)} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$$

Finalement

$$I(a) = \frac{\pi}{4}$$

Exercice 46 : [énoncé]

La fonction $f : t \mapsto \sqrt{t} + a\sqrt{t+1} + b\sqrt{t+2}$ est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

Par développements limités

$$f(t) = (1+a+b)\sqrt{t} + \frac{a+2b}{2} \frac{1}{\sqrt{t}} + O\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right) \text{ quand } t \rightarrow +\infty$$

Si $1+a+b \neq 0$ alors $f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$ ou $-\infty$ et l'intégrale n'est assurément pas convergente.

Si $1+a+b = 0$ et $a+2b \neq 0$ alors $f(t) \sim \frac{\lambda}{t^{1/2}}$ avec $\lambda \neq 0$. Par équivalence de fonction de signe constant au voisinage de $+\infty$, on peut affirmer que l'intégrale diverge.

Si $1+a+b = 0$ et $a+2b = 0$ i.e. $(a, b) = (-2, 1)$ alors $f(t) = O(1/t^{3/2})$ et donc f est intégrable.

Finalement, l'intégrale étudiée converge si, et seulement si, $(a, b) = (-2, 1)$.

Supposons que tel soit le cas.

$$\int_0^x \left(\sqrt{t} - 2\sqrt{t+1} + \sqrt{t+2}\right) dt = \frac{2}{3} \left[t^{3/2} - 2(t+1)^{3/2} + (t+2)^{3/2}\right]_0^x$$

Par développements limités

$$x^{3/2} - 2(x+1)^{3/2} + (x+2)^{3/2} \sim \frac{3}{4\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

et donc

$$\int_0^{+\infty} (\sqrt{t} + a\sqrt{t+1} + b\sqrt{t+2}) dt = \frac{4}{3} (1 - \sqrt{2})$$

Exercice 47 : [\[énoncé\]](#)

La fonction $f : t \mapsto (t - [t])e^{-at}$ est définie et continue par morceaux sur $[0, +\infty[$. Quand $t \rightarrow +\infty$, $t^2 f(t) \rightarrow 0$ donc f est intégrable sur $[0, +\infty[$.

$$\int_0^n f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^1 te^{-a(t+k)} dt = \frac{1 - e^{-na}}{1 - e^{-a}} \frac{1 - (a+1)e^{-a}}{a^2}$$

Quand $n \rightarrow +\infty$,

$$\int_0^{+\infty} f(t) dt = \frac{1 - (a+1)e^{-a}}{a^2(1 - e^{-a})}$$

Exercice 48 : [\[énoncé\]](#)

a) $x \mapsto f(x+a) - f(x)$ est continue et positive (car f est croissante).

$$\int_0^A f(x+a) - f(x) dx = \int_a^{A+a} f(x) dx - \int_0^A f(x) dx = \int_a^{A+a} f(x) dx - \int_0^a f(x) dx$$

Or $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$ donc

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{R}, x \geq M \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

et alors

$$\forall A \geq M, \left| \int_A^{A+a} f(x) dx - a\ell \right| \leq \int_A^{A+a} |f(x) - \ell| dx \leq a\varepsilon$$

donc

$$\int_A^{A+a} f(x) dx \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} a\ell$$

puis

$$\int_0^A f(x+a) - f(x) dx \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} a\ell - \int_0^a f(x) dx$$

On peut conclure que $\int_0^{+\infty} f(x+a) - f(x) dx$ est définie et

$$\int_0^{+\infty} f(x+a) - f(x) dx = a\ell - \int_0^a f(x) dx$$

b) Comme ci-dessus, mais en faisant $A \rightarrow -\infty$, on établit

$$\int_0^{-\infty} f(x+a) - f(x) dx = a\ell' - \int_0^a f(x) dx$$

avec $\ell' = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Par conséquent $\int_{-\infty}^{+\infty} \arctan(x+a) - \arctan(x) dx$ est définie par application du théorème de Chasles et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \arctan(x+a) - \arctan(x) dx = \pi a$$

Exercice 49 : [\[énoncé\]](#)

Par le changement de variable $u = \tan \frac{t}{2}$ on parvient à l'intégrale

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{8u^2 du}{(1+u^2)((1-x)^2 + (1+x)^2u^2)((1-y)^2 + (1+y)^2u^2)}$$

On peut réaliser une décomposition en éléments simples réelles de la fraction rationnelle intégrée qui pour des raisons de parité sera de la forme

$$\frac{a}{1+u^2} + \frac{b}{(1-x)^2 + (1+x)^2u^2} + \frac{c}{(1-y)^2 + (1+y)^2u^2}$$

avec

$$a = -\frac{1}{2xy}, b = -\frac{(1-x)^2(1+x)^2}{2x(x-y)(1-xy)} \text{ et } c = -\frac{(1-y)^2(1+y)^2}{2y(y-x)(1-xy)}$$

sous réserve que $x \neq y$ et $xy \neq 0$.

Puisque

$$\int_0^{+\infty} \frac{du}{\alpha^2 + \beta^2 u^2} = \frac{1}{\alpha\beta} \frac{\pi}{2}$$

on parvient à

$$I = \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2xy} - \frac{1-x^2}{2x(x-y)(1-xy)} + \frac{1-y^2}{2y(y-x)(1-xy)} \right) = \frac{\pi}{2(1-xy)}$$

Les cas exclus $x \neq y$ et $xy \neq 0$ peuvent être récupérés par continuité.

Il m'a peut-être échappé une démarche plus simple...

Exercice 50 : [énoncé]

On peut écrire

$$1 + (t + ib)^2 = (t + i(b + 1))(t + i(b - 1))$$

Si $b = \pm 1$ la fonction n'est pas intégrable sur \mathbb{R} à cause d'une singularité en 0.

Si $b \neq \pm 1$ alors la fonction $f : t \mapsto \frac{1}{1+(t+ib)^2}$ est continue par morceaux sur \mathbb{R} et

$f(t) = O\left(\frac{1}{t^2}\right)$ quand $t \rightarrow \pm\infty$ donc f est intégrable sur \mathbb{R} .

En procédant à une décomposition en éléments simples :

$$\int_{-A}^A \frac{dt}{1 + (t + ib)^2} = \frac{i}{2} \left[\frac{1}{2} \ln(t^2 + (b + 1)^2) + \arctan\left(\frac{t}{b + 1}\right) \right]_A^A - \frac{i}{2} \left[\frac{1}{2} \ln(t^2 + (b - 1)^2) + \arctan\left(\frac{t}{b - 1}\right) \right]_{-A}^{-A}$$

$x_0 = \frac{-\alpha - \sqrt{\Delta}}{2}$ et $x_1 = \frac{-\alpha + \sqrt{\Delta}}{2}$

Si $|b| > 1$ alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1 + (t + ib)^2} = 0$$

Si $|b| < 1$ alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1 + (t + ib)^2} = \pi$$

Exercice 51 : [énoncé]

Le discriminant du trinôme $x^2 + \alpha x + 1$ vaut $\Delta = \alpha^2 - 4$.

Cas $|\alpha| < 2$

On a $\Delta < 0$, le trinôme ne s'annule pas et la fonction $x \mapsto 1/(x^2 + \alpha x + 1)$ est définie et continue par morceaux sur $[0, +\infty[$. La fonction est intégrable car équivalente à $1/x^2$ en $+\infty$.

Cas $\alpha \geq 2$, le trinôme ne s'annule pas sur $[0, +\infty[$ car il est somme de termes positifs. A nouveau la fonction $x \mapsto 1/(x^2 + \alpha x + 1)$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.

Cas $\alpha \leq -2$, le trinôme $x^2 + \alpha x + 1$ présente deux racines positives et la fonction $x \mapsto 1/(x^2 + \alpha x + 1)$ n'est pas définie sur l'intégralité de l'intervalle $]0, +\infty[$.

Même en découpant l'intégrale aux points singuliers, on peut observer que les intégrales introduites ne sont pas définies. On ne parvient donc pas à donner un sens à l'intégrale étudiée dans ce cas.

Reste à calculer l'intégrale.

Cas $|\alpha| < 2$

Le trinôme $x^2 + \alpha x + 1$ s'écrit peut se réécrire

$$\left(x + \frac{\alpha}{2}\right)^2 + a^2 \text{ avec } a = \sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{4}}$$

On a alors

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + \alpha x + 1} = \left[\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{2x + \alpha}{a}\right) \right]_0^{+\infty}$$

puis

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + \alpha x + 1} = \frac{1}{a} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\alpha}{a}\right) \right)$$

Cas $\alpha = 2$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 1} = \left[-\frac{1}{x + 1} \right]_0^{+\infty} = 1$$

Cas $\alpha > 2$

Le trinôme $x^2 + \alpha x + 1$ à deux racines x_0, x_1 distinctes strictement négatives.

Par décomposition en éléments

$$\frac{1}{x^2 + \alpha x + 1} = \frac{a}{x - x_0} + \frac{b}{x - x_1}$$

avec

$$a = \frac{1}{x_1 - x_0} = \frac{1}{\sqrt{\Delta}} \text{ et } b = \frac{1}{x_0 - x_1} = -a$$

On a alors

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + \alpha x + 1} = \frac{1}{x_1 - x_0} \left[\ln \frac{x - x_0}{x - x_1} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{\Delta}} \ln \frac{\alpha + \sqrt{\Delta}}{\alpha - \sqrt{\Delta}}$$

Exercice 52 : [énoncé]

La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2 + pt + q}$ est définie et continue par morceaux sur \mathbb{R} . Puisque

$$\frac{1}{t^2 + pt + q} \underset{t \rightarrow \pm\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$$

la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2 + pt + q}$ est intégrable sur \mathbb{R} et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + pt + q} \text{ converge}$$

On a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + pt + q} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\left(t + \frac{p}{2}\right)^2 + \frac{4q - p^2}{4}} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{u^2 + a^2}$$

avec $a = \frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}$ donc

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + pt + q} = \frac{1}{a} \left[\arctan \frac{u}{a} \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{2\pi}{\sqrt{4q - p^2}}$$

Exercice 53 : [énoncé]

La fonction $t \mapsto \frac{1}{(t^2+a^2)(t^2+b^2)}$ est définie et continue par morceaux sur $]-\infty, +\infty[$.

Quand $t \rightarrow +\infty$, $f(t) \sim \frac{1}{t^4}$ donc f est intégrable sur $[0, +\infty[$.

Quand $t \rightarrow -\infty$, $f(t) \sim \frac{1}{t^4}$ donc f est intégrable sur $]-\infty, 0]$

On remarque

$$\frac{1}{t^2 + a^2} - \frac{1}{t^2 + b^2} = \frac{b^2 - a^2}{(t^2 + a^2)(t^2 + b^2)}$$

Pour $a \neq b$

$$I(a, b) = \frac{1}{b^2 - a^2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + a^2} - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + b^2} \right)$$

avec convergence des deux intégrales introduites.

Ainsi

$$I(a, b) = \frac{\pi}{ab(a + b)}$$

Pour $a = b$,

$$I(a, a) = \frac{1}{a^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(t^2 + a^2 - t^2)dt}{(t^2 + a^2)^2} = \frac{1}{a^2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(t^2 + a^2)} - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{(t^2 + a^2)^2} dt \right)$$

Par intégration par parties (avec deux convergences)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t \times t}{(t^2 + a^2)^2} dt = \left[-\frac{1}{2} \frac{t}{t^2 + a^2} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{\pi}{2a}$$

donc

$$I(a, a) = \frac{\pi}{2a^3}$$

Exercice 54 : [énoncé]

La fonction $t \mapsto P(t)/Q(t)$ est définie et continue sur \mathbb{R} .

Pour $|t| \rightarrow +\infty$, $P(t)/Q(t) = O(1/t^2)$ car $\deg(P/Q) \leq -2$.

Par suite l'intégrale $\int_{\mathbb{R}} \frac{P}{Q}$ converge.

Les pôles de la fraction P/Q sont complexes conjugués non réels et les parties polaires correspondantes sont deux à deux conjuguées. On en déduit que $P/Q = 2\text{Re}(F)$ où F est la fraction rationnelle obtenue en sommant les parties polaires relatives aux pôles de partie imaginaire strictement positive.

Considérons un pôle $a = \alpha + i\beta$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\beta > 0$.

Pour les éléments simples de la forme $\frac{1}{(X-a)^m}$ avec $m > 1$, on a

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{dt}{(t-a)^m} = \left[-\frac{1}{m-1} \frac{1}{(t-a)^{m-1}} \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0.$$

Pour les éléments simples de la forme $\frac{1}{X-a}$ on a

$$\int_{-A}^A \frac{dt}{t-a} = \int_{-A}^A \frac{t-\alpha+i\beta}{(t-\alpha)^2+\beta^2} = \left[\ln|t-\alpha| + i \arctan\left(\frac{t-\alpha}{\beta}\right) \right]_{-A}^A.$$

Quand $A \rightarrow +\infty$, on obtient $\int_{-A}^A \frac{dt}{t-a} \rightarrow i\pi$.

Puisque $\int_{\mathbb{R}} \frac{P}{Q} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \frac{P(t)}{Q(t)} dt$, on obtient $\int_{\mathbb{R}} \frac{P}{Q} = 2\text{Re}(\sigma)\pi$ avec σ la somme des coefficients facteurs des éléments simples $\frac{1}{X-a}$ avec a de parties imaginaires strictement positive.

Exercice 55 : [énoncé]

a) On écrit $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. En multipliant par la quantité conjuguée

$$\int_{-A}^A \frac{dt}{t-z} = \int_{-A}^A \frac{t-a+ib}{(t-a)^2+b^2} dt$$

puis

$$\int_{-A}^A \frac{dt}{t-z} = \left[\frac{1}{2} \ln((t-a)^2+b^2) \right]_{-A}^A + i \left[\arctan \frac{t-a}{b} \right]_{-A}^A$$

donc

$$\int_{-A}^A \frac{dt}{t-z} \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \begin{cases} i\pi & \text{si } \text{Im}z > 0 \\ -i\pi & \text{sinon} \end{cases}$$

b) Les pôles de F sont assurément non réels.

La partie entière de F est nécessairement nulle car F est intégrable.

Dans la décomposition en éléments simples de F , les termes en $1/(X-a)^k$ avec $k \geq 2$ déterminent des expressions intégrables. Puisque F est aussi intégrable, on peut affirmer par différence que le terme

$$\sum_{a \in P} \frac{R_a}{(t-a)}$$

(avec P l'ensemble des pôles de F) est intégrable sur \mathbb{R} . Or

$$t \times \sum_{a \in P} \frac{R_a}{(t-a)} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} \sum_{a \in P} R_a$$

Il est donc nécessaire que

$$\sum_{a \in P} R_a = 0$$

c) Les termes en $1/(X - a)^k$ (avec $k \geq 2$) de la décomposition en éléments simples de F induisent des intégrales sur \mathbb{R} nulles. Par conséquent

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F = \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{a \in P} \frac{R_a}{t - a} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \sum_{a \in P} \int_{-A}^A \frac{R_a}{t - a} dt$$

Puisque les parties polaires sont deux à deux conjuguées

$$\sum_{a \in P} \int_{-A}^A \frac{R_a}{t - a} dt = \sum_{a \in P^+} \int_{-A}^A \frac{R_a}{t - a} + \frac{\overline{R_a}}{t - \bar{a}} dt$$

puis

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F = 2i\pi \sum_{a \in P^+} \text{Im}(R_a)$$

Mais

$$\sum_{a \in P} R_a = 0$$

donne

$$\sum_{a \in P^+} R_a + \overline{R_a} = 2 \sum_{a \in P^+} \text{Re}(R_a) = 0$$

Finalement

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F = 2i\pi \sum_{a \in P^+} R_a$$

d) Puisque $n \geq m + 1$, l'intégrabilité est acquise. Les pôles de la fraction

$$\frac{X^{2m}}{1 + X^{2n}}$$

sont simples et ce sont les

$$z_k = e^{\frac{i(2k+1)}{2n}\pi}$$

avec $k \in \{0, \dots, 2n - 1\}$.

Pour chaque $k \in \{0, \dots, 2n - 1\}$,

$$R_{z_k} = \left. \frac{X^{2m}}{(1 + X^{2n})'} \right|_{X=z_k} = -\frac{z_k^{2m+1}}{2n}$$

Les pôles de parties imaginaires positives sont obtenus pour $k \in \{0, \dots, n - 1\}$ et après sommation géométrique on obtient

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^{2m}}{1 + x^{2n}} dx = \frac{\pi}{n \sin\left(\frac{(2m+1)\pi}{2n}\right)}$$

Exercice 56 : [énoncé]

a) La fonction définissant l'intégrande est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$. Elle est prolongeable par continuité en 0 et négligeable devant $1/x^2$ en $+\infty$. Elle est donc intégrable.

b) Procédons au changement de variable $u = a/x$ sur l'intégrale de \sqrt{a} à $+\infty$

$$\int_{\sqrt{a}}^{+\infty} \exp\left(-\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right)\right) dx = \int_0^{\sqrt{a}} \exp\left(-\left(\frac{a^2}{u^2} + u^2\right)\right) \frac{a}{u^2} du$$

En renommant la variable d'intégration et en regroupant les intégrales sur $]0, \sqrt{a}[$ et $[\sqrt{a}, +\infty[$, on obtient

$$I(a) = \int_0^{\sqrt{a}} \exp\left(-\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right)\right) \left(1 + \frac{a}{x^2}\right) dx$$

c) On peut écrire

$$x^2 + \frac{a^2}{x^2} = \left(x - \frac{a}{x}\right)^2 + 2a$$

avec

$$\frac{d}{dx} \left(x - \frac{a}{x}\right) = 1 + \frac{a}{x^2}$$

ce qui motive le changement de variable $t = x - a/x$

$$I(a) = \int_{-\infty}^0 e^{-t^2 - 2a} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2a}$$

Par parité

$$I(a) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2|a|} \text{ pour } a \in \mathbb{R}$$

Exercice 57 : [énoncé]

a) L'intégrale en premier membre existe et définit une fonction dérivable de x avec

$$\frac{d}{dx} \left(\int_x^{+\infty} \frac{f(at) - f(bt)}{t} dt \right) = -\frac{f(ax) - f(bx)}{x}$$

L'intégrale en second membre définit aussi une fonction dérivable de x avec

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{ax}^{bx} \frac{f(u)}{u} du \right) = b \frac{f(bx)}{bx} - a \frac{f(ax)}{ax} = \frac{f(bx) - f(ax)}{x}$$

On en déduit que les deux membres de l'égalité voulue sont égaux à une constante près.

Or ces deux fonctions de x sont de limite nulle quand $x \rightarrow +\infty$ et la constante précédente est alors nulle.

b) Par continuité de f en 0, on peut écrire

$$f(t) = f(0) + \varphi(t) \text{ avec } \varphi \text{ de limite nulle en } 0$$

On a alors

$$\int_{ax}^{bx} \frac{f(t)}{t} dt = f(0) \ln \frac{b}{a} + \int_{ax}^{bx} \frac{\varphi(t)}{t} dt$$

Or

$$\left| \int_{ax}^{bx} \frac{\varphi(t)}{t} dt \right| \leq \max_{t \in [ax, bx]} |\varphi(t)| \int_{ax}^{bx} \frac{dt}{t} = \ln \frac{b}{a} \max_{t \in [ax, bx]} |\varphi(t)| \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$$

On conclut à la convergence de l'intégrale et à la valeur

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(at) - f(bt)}{t} dt = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

Exercice 58 : [\[énoncé\]](#)

Par le changement de variable proposé (qui est une bijection de classe \mathcal{C}^1), on obtient

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1 + e^{-2x}}{1 + e^{-4x}} e^{-x} dx$$

qui se réécrit

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\text{cht}}{\text{ch}2t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\text{cht}}{1 + 2\text{sh}^2t} dt$$

et donc

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\arctan(\sqrt{2}\text{sh}t) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

Exercice 59 : [\[énoncé\]](#)

a) L'intégrale de départ est bien définie. En effet, la fonction $f : x \mapsto (1 + x^2)/(1 + x^4)$ est définie et continue par morceaux sur $[0, +\infty[$ et on vérifie $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 1/x^2$ ce qui donne un argument d'intégrabilité.

Par le changement de variable \mathcal{C}^1 strictement croissant $x = e^t$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 + x^2}{1 + x^4} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2t} + 1}{e^{4t} + 1} e^t dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\text{cht}}{\text{ch}2t} dt$$

Or

$$\text{ch}2t = 2\text{ch}^2t - 1 = 1 + 2\text{sh}^2t$$

Par le nouveau changement de variable \mathcal{C}^1 strictement croissant $u = \text{sh}t$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 + x^2}{1 + x^4} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{1 + 2u^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\arctan(\sqrt{2}u) \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

b) Par le changement de variable \mathcal{C}^1 strictement monotone $x = 1/t$, on obtient

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{1 + x^4}$$

et donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

Exercice 60 : [\[énoncé\]](#)

$f : t \mapsto \frac{1}{(1+t^2)^2}$ est définie et continue sur $[0, +\infty[$ et $f(t) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^4}$ donc I existe.

Via le changement de variable $u = 1/t$:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{u^2 du}{(1 + u^2)^2}$$

d'où

$$2I = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + t^2} = \frac{\pi}{2}$$

puis $I = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 61 : [\[énoncé\]](#)

a) Les deux intégrales convergent. Le changement de variable $u = 1/x$ transforme l'une en l'autre.

b)

$$2I = \int_0^{+\infty} \frac{(x+1)dx}{x^3+1} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2-x+1} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right]_0^{+\infty}$$

donc

$$I = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

Exercice 62 : [\[énoncé\]](#)

On a

$$\sqrt{\tan \theta} \Big|_{\theta=\pi/2-h} = \sqrt{\frac{\sin(\pi/2-h)}{\cos(\pi/2-h)}} = \sqrt{\frac{\cos h}{\sin h}} \sim \frac{1}{\sqrt{h}}$$

donc l'intégrale est bien définie.

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan \theta} d\theta \stackrel{u=\sqrt{\tan \theta}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{2u^2}{1+u^4} du = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

après calculs...

Exercice 63 : [\[énoncé\]](#)

On procède au changement de variable

$$x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin t$$

avec $t \in [-\pi/2, \pi/2]$.

On obtient

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = \pi$$

(avec convergence de l'intégrale) et

$$\int_0^1 \sqrt{x(1-x)} dx = \frac{\pi}{8}$$

Exercice 64 : [\[énoncé\]](#)

Considérons l'application continue $\varphi : x \mapsto x - 1/x$. Par étude des variations de φ , on peut affirmer que φ réalise une bijection φ_+ de $]0, +\infty[$ vers \mathbb{R} et une bijection φ_- de $] -\infty, 0[$ vers \mathbb{R} .

Après résolution de l'équation $\varphi(x) = y$ d'inconnue x , on obtient

$$\varphi_+^{-1}(y) = \frac{1}{2} (y + \sqrt{y^2 + 4}) \text{ et } \varphi_-^{-1}(y) = \frac{1}{2} (y - \sqrt{y^2 + 4})$$

Formellement, par le changement de variable $y = \varphi_+(x)$ avec φ_+ bijection de classe \mathcal{C}^1

$$\int_0^{+\infty} g(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \frac{1}{2} \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 + 4}} \right) dy$$

Puisque f est intégrable et que

$$\left| \frac{1}{2} \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 + 4}} \right) \right| \leq 1$$

la fonction

$$y \mapsto f(y) \frac{1}{2} \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 + 4}} \right)$$

est intégrable sur \mathbb{R} .

Par le changement de variable précédent, on peut alors affirmer que g est intégrable sur $]0, +\infty[$.

L'étude sur $] -\infty, 0[$ est semblable.

Au final, on obtient

$$\int_{-\infty}^0 g(x) dx + \int_0^{+\infty} g(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \left(1 - \frac{y}{\sqrt{y^2 + 4}} \right) dy + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 + 4}} \right) dy$$

Exercice 65 : [\[énoncé\]](#)

Comme $t^2 \times t^n e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$, la fonction continue par morceaux $t \mapsto t^n e^{-t}$ est

donc intégrable sur $[0, +\infty[$ et $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ converge.

Par intégration par parties justifiée par deux convergences

$$I_{n+1} = [-t^{n+1} e^{-t}]_0^{+\infty} + (n+1) \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = (n+1) I_n.$$

Comme $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$ on a

$$I_n = n!$$

Exercice 66 : [\[énoncé\]](#)

La fonction $x \mapsto x^n (\ln x)^n$ est définie et continue sur $]0, 1]$ et y est intégrable car on peut la prolonger par continuité en 0 sachant $x \ln x \xrightarrow[x \rightarrow 0^+]{} 0$. L'intégrale

définissant I_n est donc convergente.

Soit $\varepsilon \in]0, 1]$. Par intégration par parties

$$\int_\varepsilon^1 x^n (\ln x)^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} (\ln x)^n \right]_\varepsilon^1 - \frac{n}{n+1} \int_\varepsilon^1 x^n (\ln x)^{n-1} dx$$

Quand $\varepsilon \rightarrow 0$, on obtient

$$I_n = -\frac{n}{n+1} \int_0^1 x^n (\ln x)^{n-1} dx$$

la nouvelle intégrale étant convergente par le même argument qu'au dessus.
En répétant l'opération, on obtient

$$I_n = (-1)^n \frac{n!}{(n+1)^n} \int_0^1 x^n dx = (-1)^n \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}$$

On peut aussi procéder au calcul par le changement de variable $u = -\ln(x^{n+1}) \in \mathcal{C}^1$ strictement monotone

$$I_n = \frac{(-1)^n}{(n+1)^{n+1}} \int_0^{+\infty} u^n e^{-u} du = \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}$$

Exercice 67 : [énoncé]

$f : x \mapsto \frac{1}{(1+x^2)^{n+1}}$ est définie et continue sur \mathbb{R}^+ .

$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ donc f est intégrable et $I_n = \int_0^{+\infty} f(x) dx$ existe.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)^{n+1}} dx = I_{n-1} - \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^{n+1}} dx$$

Or

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^{n+1}} dx \underset{\text{iPP}}{=} \left[-\frac{1}{2n} \frac{x}{(1+x^2)^n} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{2n} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{1}{2n} I_{n-1}$$

L'intégration par parties est justifiée par deux convergences.

On obtient ainsi

$$I_n = \frac{2n-1}{2n} I_{n-1}$$

Puisque $I_0 = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$,

$$I_n = \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 1}{(2n)(2n-2)\dots 2} I_0 = \frac{(2n)!}{2^{2n+1}(n!)^2} \pi$$

Exercice 68 : [énoncé]

a) La fonction f est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

Quand $t \rightarrow 0^+$, $\sqrt{t}f(t) \rightarrow 0$ et quand $t \rightarrow +\infty$, $t^{3/2}f(t) \rightarrow 0$ donc f est intégrable sur $]0, 1]$ et $[1, +\infty[$.

b) Par une intégration par parties où l'on choisit judicieusement une primitive s'annulant en 0

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt = \left[\ln t \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = -\ln 2$$

Par le changement de variable $u = 1/t$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt = - \int_0^1 \frac{\ln u}{(u+1)^2} du = \ln 2$$

Exercice 69 : [énoncé]

$f : x \mapsto \frac{\ln(1-x^2)}{x^2}$ est définie et continue sur $]0, 1[$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $f(x) \sim \frac{-x^2}{x^2} = -1$ ce qui permet de prolonger f par continuité en 0.

Quand $x \rightarrow 1^-$: $x = 1-h$ avec $h \rightarrow 0^+$ et

$$\sqrt{1-x}f(x) = \sqrt{h} \frac{\ln(2h-h^2)}{(1-h)^2} \sim \sqrt{h} \ln h \rightarrow 0$$

Nous allons calculer l'intégrale en procédant par intégration par parties en primitivant $\frac{1}{x^2}$ en $\frac{x-1}{x}$ qui s'annule en 1.

$$\int_0^1 \frac{\ln(1-x^2)}{x^2} dx = \left[\ln(1-x^2) \frac{x-1}{x} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{2x}{(1-x^2)} \frac{x-1}{x} dx$$

L'intégration par parties car le crochet converge. On en déduit

$$\int_0^1 \frac{\ln(1-x^2)}{x^2} dx = - \int_0^1 \frac{2}{(1+x)} dx = -2 \ln 2$$

Exercice 70 : [énoncé]

La fonction $f : t \mapsto \ln(1+1/t^2)$ est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

Quand $t \rightarrow +\infty$, on a $f(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} 1/t^2$ en exploitant $\ln(1+u) \underset{u \rightarrow 0}{\sim} u$.

Quand $t \rightarrow 0$, $\sqrt{t}f(t) = \sqrt{t} \ln(1+t^2) - 2\sqrt{t} \ln t \rightarrow 0$ et donc $f(t) = o(1/\sqrt{t})$

On en déduit que f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

Par intégration par parties

$$\int_{\varepsilon}^A \ln \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) dt = [t \ln(1 + 1/t^2)]_{\varepsilon}^A + \int_{\varepsilon}^A \frac{2 dt}{1 + t^2}$$

Par des arguments asymptotiques semblables à ceux utilisés ci-dessus, on montre

$$A \ln(1 + 1/A^2) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 0$$

et

$$\varepsilon \ln(1 + 1/\varepsilon^2) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0$$

On en déduit

$$\int_0^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) dt = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + t^2} = \pi$$

Notons que le calcul ici réalisé peut aussi être utilisé pour justifier la convergence de l'intégrale.

Exercice 71 : [énoncé]

Les fonctions u et v sont définies et continues par morceaux sur $[1, +\infty[$. Puisque l'intégrale de f sur $[1, +\infty[$ converge, on a

$$u(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right) \text{ quand } x \rightarrow +\infty$$

et donc u est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Puisque $1/x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, on a

$$v(x) = o(f(x)) \text{ quand } x \rightarrow +\infty$$

et donc v aussi est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Par intégration par parties

$$\int_1^A u(x) dx = \left[-\frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt \right]_1^A + \int_1^A v(x) dx$$

et donc $A \rightarrow +\infty$ on obtient

$$\int_1^{+\infty} u(x) dx = \int_1^{+\infty} v(x) dx$$

Exercice 72 : [énoncé]

Quand $t \rightarrow 0^+$,

$$\frac{f(t)}{t} = \frac{f(t) - f(0)}{t} \rightarrow f'(0)$$

La fonction $t \mapsto f(t)/t$ peut donc se prolonger par continuité en 0 ce qui permet d'assurer l'existence des intégrales écrites.

Par intégration par parties

$$\int_{\varepsilon}^x \left(\frac{f(t)}{t} \right)^2 dt = \left[-\frac{(f(t))^2}{t} \right]_{\varepsilon}^x + 2 \int_{\varepsilon}^x \frac{f(t)f'(t)}{t} dt$$

Quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$, on obtient

$$\int_0^x \left(\frac{f(t)}{t} \right)^2 dt = -\frac{(f(x))^2}{x} + 2 \int_0^x \frac{f(t)f'(t)}{t} dt$$

et l'inégalité affirmée est désormais évidente.

Exercice 73 : [énoncé]

a) $x \mapsto u'(x)$, $x \mapsto u(x)$ et $x \mapsto xu(x)$ sont de carrés intégrables donc $x \mapsto (xu(x)^2)' = u(x)^2 + xu'(x)u(x)$ est intégrable sur \mathbb{R} . Par suite $x \mapsto xu(x)^2$ admet des limites finies quand $x \rightarrow \pm\infty$. Or cette fonction est elle-même intégrable sur \mathbb{R} donc ses limites en $\pm\infty$ ne peuvent qu'être nulles.
b) Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u'(x)^2 dx \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 u(x)^2 dx \geq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} xu'(x)u(x) dx \right)^2$$

Or par intégration par parties

$$\int_{-n}^n xu'(x)u(x) dx = [xu^2(x)]_{-n}^n - \int_{-n}^n u(x)(u(x) + xu'(x)) dx \text{ donc}$$

Ainsi

$$\int_{-n}^n xu'(x)u(x) dx = \frac{1}{2} [xu^2(x)]_{-n}^n - \frac{1}{2} \int_{-n}^n u^2(x) dx$$

puis à la limite

$$\int_{-\infty}^{+\infty} xu'(x)u(x) dx = -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} u^2(x) dx$$

et enfin l'inégalité voulue.

Exercice 74 : [énoncé]

La fonction $f : t \mapsto \ln(1 + t^2/t^2)$ est définie et continue sur $I =]0, +\infty[$.

On a

$$\sqrt{t}f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0 \text{ et } f(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$$

donc f est intégrable et l'intégrale étudiée converge.

Par intégration par parties justifiée par la convergence des deux intégrales écrites

$$\int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt = [t \ln(1 + 1/t^2)]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2 dt}{1 + t^2} = \pi$$

Exercice 75 : [énoncé]

Notons que l'intégrale I_n est bien définie.

a) On découpe l'intégrale en deux

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^n} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^n}$$

On réalise le changement de variable $x = 1/t$ sur la deuxième intégrale

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^n} + \int_1^0 -\frac{t^{n-2} dt}{1 + t^n}$$

puis on combine les deux intégrales pour obtenir

$$I_n = \int_0^1 \frac{1 + t^{n-2}}{1 + t^n} dt$$

b) On peut écrire

$$I_n = 1 + \int_0^1 \frac{t^{n-2} - t^n}{(1 + t^n)} dt$$

D'une part

$$\int_0^1 \frac{t^n}{1 + t^n} dt = \frac{1}{n} \int_0^1 t \frac{nt^{n-1}}{1 + t^n} dt$$

ce qui donne par intégration par parties

$$\int_0^1 \frac{t^n}{1 + t^n} dt = \frac{1}{n} \ln 2 - \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1 + t^n) dt$$

avec

$$0 \leq \int_0^1 \ln(1 + t^n) dt \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$$

D'une part

$$\int_0^1 \frac{t^{n-2}}{1 + t^n} dt = \frac{1}{n} \int_{]0,1]} \frac{1}{t} \frac{nt^{n-1}}{1 + t^n} dt$$

avec par intégration par parties

$$\int_\varepsilon^1 \frac{1}{t} \frac{nt^{n-1}}{1 + t^n} dt = \left[\frac{\ln(1 + t^n)}{t} \right]_\varepsilon^1 + \int_\varepsilon^1 \frac{\ln(1 + t^n)}{t^2} dt$$

Quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$, on obtient

$$\int_{]0,1]} \frac{1}{t} \frac{nt^{n-1}}{1 + t^n} dt = \ln 2 + \int_{]0,1]} \frac{\ln(1 + t^n)}{t^2} dt$$

où, sachant $\ln(1 + u) \leq u$,

$$0 \leq \int_{]0,1]} \frac{\ln(1 + t^n)}{t^2} dt \leq \int_0^1 t^{n-2} dt = \frac{1}{n-1} \rightarrow 0$$

On en déduit

$$I_n = 1 + o(1/n)$$

Exercice 76 : [énoncé]

La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{(1+x^3)^{n+1}}$ est définie et continue sur $[0, +\infty[$. Puisque $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x^{3n+3}}$, la fonction f est intégrable sur $[0, +\infty[$ et l'intégrale J_n converge.

a) Via une décomposition en éléments simples $J_0 = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$.

b) $J_n - J_{n+1} = \int_0^{+\infty} x \times \frac{x^2}{(1+x^3)^{n+2}} dx$. En procédant à une intégration par parties justifiée par deux convergences : $J_{n+1} = \frac{3n-1}{3n} J_n$.

c) On pose $v_n = \sqrt[3]{n} J_n$.

$$\ln v_{n+1} - \ln v_n = \ln \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} + \ln \left(1 - \frac{1}{3n}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

donc la série de terme général $\ln v_{n+1} - \ln v_n$ converge et donc la suite de terme général $\ln v_n$ converge vers un certain réel ℓ . En posant $A = e^\ell > 0$, on obtient $v_n \rightarrow A$ donc $J_n \sim \frac{A}{\sqrt[3]{n}}$.

Exercice 77 : [énoncé]

a) La fonction

$$f : t \mapsto \frac{t - [t]}{t(t+n)}$$

est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

Quand $t \rightarrow 0^+$,

$$f(t) = \frac{t}{t(t+n)} = \frac{1}{t+n} \rightarrow \frac{1}{n}$$

Quand $t \rightarrow +\infty$,

$$f(t) = \frac{O(1)}{t(t+n)} = O\left(\frac{1}{t^2}\right)$$

On en déduit que f est intégrable sur $]0, +\infty[$.

b) On remarque que

$$\frac{1}{t(t+n)} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+n} \right)$$

et on en déduit

$$\int_0^A \frac{t - [t]}{t(t+n)} dt = \frac{1}{n} \int_0^A \frac{t - [t]}{t} dt - \frac{t - [t]}{t+n} dt$$

Par linéarité de l'intégrale et changement de variable, on obtient

$$\int_0^A \frac{t - [t]}{t(t+n)} dt = \frac{1}{n} \left(\int_0^A \frac{t - [t]}{t} dt - \int_n^{A+n} \frac{t - [t]}{t} dt \right)$$

Enfin par la relation de Chasles

$$\int_0^A \frac{t - [t]}{t(t+n)} dt = \frac{1}{n} \left(\int_0^n \frac{t - [t]}{t} dt - \int_A^{A+n} \frac{t - [t]}{t} dt \right)$$

Puisque

$$0 \leq \int_A^{A+n} \frac{t - [t]}{t} dt \leq \frac{1}{A} \int_A^{A+n} t - [t] dt \leq \frac{n}{A}$$

on obtient quand $A \rightarrow +\infty$

$$u_n = \frac{1}{n} \int_0^n \frac{t - [t]}{t} dt$$

c)

$$v_n = \int_0^n \frac{t - [t]}{t} dt$$

Par suite

$$v_n - v_{n-1} = \int_{n-1}^n \frac{t - [t]}{t} dt = \int_0^1 \frac{u}{u + (n-1)} du$$

puis

$$v_n - v_{n-1} = 1 - (n-1) \ln \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)$$

Par développement limité, on obtient

$$v_n - v_{n-1} = \frac{1}{2(n-1)} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

On en déduit que la série de terme général

$$v_n - v_{n-1} - \frac{1}{2n} = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

d) Posons

$$S = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(H(n) - H(n-1) - \frac{1}{2n} \right)$$

On a

$$\sum_{k=1}^n \left(v_k - v_{k-1} - \frac{1}{2k} \right) = S + o(1)$$

donc

$$v_n - v_1 - \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} = S + o(1)$$

Sachant

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$$

on obtient

$$v_n \sim \frac{\ln n}{2}$$

puis

$$u_n \sim \frac{\ln n}{2n}$$

Exercice 78 : [\[énoncé\]](#)

a) 0, cf. lemme de Lebesgue.

b) Posons

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2nt) \cos t}{\sin t} dt$$

Cette intégrale existe car un prolongement par continuité est possible en 0.

On observe

$$\sin(2(n+1)t) - \sin(2nt) = 2 \sin t \cos(2n+1)t$$

et donc

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} 2 \cos((2n+1)t) \cos t dt = 0$$

La suite (I_n) est constante égale à

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} 2 \cos^2 t dt = \frac{\pi}{2}$$

c) On a

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2nt) \cos t}{\sin t} dt - \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2nt)}{t} dt = \int_0^{\pi/2} \sin(2nt) f(t) dt$$

avec

$$f(t) = \cot t - \frac{1}{t}$$

qui se prolonge en une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur $[0, \pi/2]$.

Ainsi

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2nt)}{t} dt \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

Or

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2nt)}{t} dt = \int_0^{n\pi} \frac{\sin u}{u} du$$

donc la convergence de l'intégrale de Dirichlet étant supposée connue, on obtient

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

d) On a

$$\int_0^{\pi/2} \ln(2 \sin(t/2)) \cos(nt) dt = \int_0^{\pi/2} \ln\left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right) \cos(nt) dt + \int_0^{\pi/2} \ln(t) \cos(nt) dt$$

Par intégration par parties,

$$\int_0^{\pi/2} \ln(t) \cos(nt) dt = \frac{\ln(\pi/2) \sin(n\pi/2)}{n} - \frac{1}{n} \int_0^{n\pi/2} \frac{\sin u}{u} du$$

La fonction $t \mapsto \ln\left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right)$ se prolonge en une fonction de classe \mathcal{C}^2 sur $[0, \pi/2]$.

Par intégration par parties,

$$\int_0^{\pi/2} \ln\left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right) \cos(nt) dt = \frac{1}{n} \ln\left(\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right) \sin(n\pi/2) - \frac{1}{n} \int_0^{\pi/2} \left(\ln\left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right)\right)' \sin(nt) dt$$

La fonction $t \mapsto \left(\ln\left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right)\right)'$ étant de classe \mathcal{C}^1 sur $[0, \pi/2]$, on a

$$\frac{1}{n} \int_0^{\pi/2} \left(\ln\left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right)\right)' \sin(nt) dt = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

et donc

$$\int_0^{\pi/2} \ln(2 \sin(t/2)) \cos(nt) dt \sim \frac{(\ln 2) \sin(n\pi/2) - \pi}{2n}$$

Exercice 79 : [\[énoncé\]](#)

La fonction intégrée est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

Elle se prolonge par continuité par la valeur 1 en 0 et est donc intégrable sur $]0, 1]$

Par une intégration par parties

$$\int_1^A \frac{\sin t}{t} dt = \left[\frac{-\cos t}{t}\right]_1^A + \int_1^A \frac{\cos t}{t^2} dt$$

Or il y a convergence des deux termes en second membre quand $A \rightarrow +\infty$, donc il y a convergence de

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

et finalement l'intégrale étudiée converge.

Exercice 80 : [\[énoncé\]](#)

Par intégration par parties

$$\int_\varepsilon^A \frac{\sin t}{t} dt = \left[\frac{1 - \cos t}{t}\right]_\varepsilon^A + \int_\varepsilon^A \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$$

Or il y a convergence des deux termes en second membre quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$ et $A \rightarrow +\infty$ donc il y a convergence de l'intégrale en premier membre et on a l'égalité

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$$

Puisque $1 - \cos t = 2 \sin^2(t/2)$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} 2 \frac{\sin^2(t/2)}{t^2} dt$$

Enfin par le changement de variable $u = t/2$ sous-jacent à une bijection de classe \mathcal{C}^1

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 u}{u^2} du$$

Exercice 81 : [\[énoncé\]](#)

Commençons par étudier la convergence de la suite (S_n) de terme général

$$S_n = \int_0^{n\pi} f(t) \sin(t) dt$$

Par la relation de Chasles, on peut découper l'intégrale

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(t) \sin(t) dt$$

Par translation de la variable

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(t) \sin(t) dt = \int_0^\pi f(t + k\pi) \sin(t + k\pi) dt = (-1)^k v_k$$

avec

$$v_k = \int_0^\pi f(t + k\pi) \sin(t) dt$$

Puisque f est positive, la suite (v_k) est à termes positifs.

Puisque f est décroissante, la suite (v_k) est décroissante.

Enfin, puisque f tend vers 0 en $+\infty$ et puisque

$$0 \leq v_k \leq f(k\pi)\pi$$

la suite (v_n) tend vers 0.

Par le critère spécial des séries alternées, on obtient que la série de terme général $(-1)^k v_k$ converge, autrement dit, que la suite (S_n) converge. Notons S sa limite. Soit $X \geq 0$. En notant n_X la partie entière de X/π , on peut écrire

$$\int_0^X f(t) \sin(t) dt = S_{n_X} + \int_{n_X\pi}^X f(t) dt$$

avec

$$0 \leq \int_{n_X\pi}^X f(t) dt \leq \int_{n_X\pi}^X f(n_X\pi) dt = f(n_X\pi)(X - n_X\pi) \leq f(n_X\pi)\pi$$

Quand $X \rightarrow +\infty$, on a $n_X \rightarrow +\infty$, $S_{n_X} \rightarrow S$ et par l'encadrement qui précède

$$\int_{n_X\pi}^X f(t) dt \rightarrow 0$$

On en déduit

$$\int_0^X f(t) \sin(t) dt \rightarrow S$$

Exercice 82 : [\[énoncé\]](#)

Par intégration par parties

$$\int_0^x \sin(e^t) dt = \int_0^x e^t \sin(e^t) e^{-t} dt = [-\cos(e^t) e^{-t}]_0^x - \int_0^x \cos(e^t) e^{-t} dt$$

D'une part

$$\cos(e^x) e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

et d'autre part $t \mapsto \cos(e^t) e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car

$$t^2 \cos(e^t) e^{-t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$$

donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} \sin(e^t) dt$ converge.

Exercice 83 : [\[énoncé\]](#)

$f : t \mapsto \cos(t^2)$ est définie et continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

Formellement

$$\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt = \int_0^{+\infty} \frac{2t}{2t} \cos(t^2) dt = \left[\frac{\sin(t^2)}{2t} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{\sin t^2}{2t^2} dt$$

Puisque le crochet converge et que $t \mapsto \frac{\sin t^2}{2t^2}$ est aisément intégrable sur $]0, +\infty[$, l'intégration par parties est justifiée par deux convergences et $\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt$ converge.
Idem pour $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$ en proposant une primitive de $2t \sin(t^2)$ en $1 - \cos t^2$.

Exercice 84 : [énoncé]

Par un argument de parité, il suffit d'établir la convergence de

$$\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{2t}{2t} e^{it^2} dt$$

Formellement

$$\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2t}{2t} e^{it^2} dt = \left[\frac{e^{it^2} - 1}{2it} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{2i} \int_0^{+\infty} \frac{e^{it^2} - 1}{t^2} dt$$

où la primitive de $2te^{it^2}$ a été choisie de sorte de s'annuler en 0. Puisque les deux termes en second membre sont convergents, le théorème d'intégration par parties s'applique et assure la convergence de

$$\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$$

Exercice 85 : [énoncé]

Procédons au changement de variable de classe \mathcal{C}^1 , $t = \sqrt{\lambda x}$

$$f(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \int_0^{\sqrt{\lambda}} e^{it^2} dt$$

Or par le changement de variable $u = t^2$

$$\int_0^A e^{it^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^{A^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du$$

puis par intégration par parties

$$\int_0^A e^{it^2} dt = \frac{1}{2} \left(\left[\frac{e^{iu} - 1}{i\sqrt{u}} \right]_0^A + \frac{1}{2} \int_0^{A^2} \frac{e^{iu} - 1}{iu^{3/2}} du \right)$$

et donc

$$\int_0^A e^{it^2} dt = \frac{i}{4} \int_0^{A^2} \frac{1 - e^{iu}}{u^{3/2}} du$$

L'intégrale en second membre converge donc

$$\int_0^A e^{it^2} dt \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} C$$

De plus, la partie imaginaire de C est strictement positive en vertu de l'expression intégrale précédente, donc

$$f(\lambda) \underset{\lambda \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{C}{\sqrt{\lambda}}$$

Le calcul explicite de C est difficile, cf. intégrale de Fresnel.

Exercice 86 : [énoncé]

a) Pour $x > a > 0$

$$\int_a^x e^{it^2} dt = \int_a^x \frac{2it}{2it} e^{it^2} dt = \left[\frac{e^{it^2} - 1}{2it} \right]_a^x + \int_a^x \frac{e^{it^2} - 1}{2it^2} dt$$

A la limite quand $a \rightarrow 0$,

$$\int_a^x e^{it^2} dt \rightarrow \int_0^x e^{it^2} dt, \frac{e^{ia^2} - 1}{2ia} \sim \frac{a}{2} \rightarrow 0$$

et

$$\int_a^x \frac{e^{it^2} - 1}{2it^2} dt \rightarrow \int_0^x \frac{e^{it^2} - 1}{2it^2} dt$$

car cette dernière intégrale converge.

Ainsi

$$f(x) = \frac{e^{ix^2} - 1}{2ix} + \frac{1}{2i} \int_0^x \frac{e^{it^2} - 1}{t^2} dt$$

Puisque

$$\left| \frac{e^{ix^2} - 1}{2ix} \right| \leq \frac{1}{x} \rightarrow 0 \text{ et } \int_0^x \frac{e^{it^2} - 1}{2it^2} dt \rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{e^{it^2} - 1}{2it^2} dt$$

car cette dernière intégrale converge.

Par suite

$$f(x) \rightarrow \lambda = \int_0^{+\infty} \frac{e^{it^2} - 1}{2it^2} dt$$

b)

$$g(x) = \lambda - f(x) = \frac{1}{2i} \int_x^{+\infty} \frac{e^{it^2} - 1}{t^2} dt - \frac{e^{ix^2} - 1}{2ix}$$

donc

$$g(x) = \frac{1}{2i} \int_x^{+\infty} \frac{e^{it^2}}{t^2} dt - \frac{1}{2i} \int_x^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt - \frac{e^{ix^2} - 1}{2ix}$$

car ces deux dernières intégrales sont bien définies. Par suite

$$g(x) = \frac{1}{2i} \int_x^{+\infty} \frac{e^{it^2}}{t^2} dt - \frac{e^{ix^2}}{2ix}$$

c) Par intégration par parties généralisée

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{it^2}}{t^2} dt = \int_x^{+\infty} \frac{te^{it^2}}{t^3} dt = \left[\frac{e^{it^2}}{2it^3} \right]_x^{+\infty} + \frac{3}{2i} \int_x^{+\infty} \frac{e^{it^2}}{t^4} dt$$

Par suite

$$\left| \int_x^{+\infty} \frac{e^{it^2}}{t^2} dt \right| = \left| -\frac{e^{ix^2}}{2ix^3} + \frac{3}{2i} \int_x^{+\infty} \frac{e^{it^2}}{t^4} dt \right| \leq \frac{1}{2x^3} + \frac{3}{2} \int_x^{+\infty} \frac{dt}{t^4} = \frac{1}{x^3}$$

Donc

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{it^2}}{t^2} dt = O\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

Exercice 87 : [énoncé]

Soit F la primitive de f s'annulant en 0. Par hypothèse

$$F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell = \int_0^{+\infty} f(t) dt$$

Par intégration par parties, on peut écrire

$$\frac{1}{x} \int_0^x tf(t) dt = F(x) - \frac{1}{x} \int_0^x F(t) dt$$

Or

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x F(t) dt - \ell \right| \leq \frac{1}{x} \int_0^x |F(t) - \ell| dt$$

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $A \in \mathbb{R}^+$ tel que

$$\forall t \geq A, |F(t) - \ell| \leq \varepsilon$$

Par continuité sur $[0, A]$, $|F(t) - \ell|$ est majorée par un certain $M > 0$.

Pour $x \geq \max(A, AM/\varepsilon)$ on a

$$\frac{1}{x} \int_0^x |F(t) - \ell| dt = \frac{1}{x} \int_0^A |F(t) - \ell| dt + \frac{1}{x} \int_A^x |F(t) - \ell| dt \leq 2\varepsilon$$

Par conséquent

$$\frac{1}{x} \int_0^x F(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$$

puis

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x tf(t) dt = 0$$

Notons que sans l'hypothèse d'intégrabilité de f , on ne peut pas exploiter le théorème de convergence dominée.

Exercice 88 : [énoncé]

Supposons la convergence de l'intégrale de f sur $[1, +\infty[$.

Puisque f est continue, on peut introduire une primitive F de f et celle-ci admet donc une limite finie en $+\infty$. Par intégration par parties

$$\int_1^A \frac{f(t)}{t} dt = \left[\frac{F(t)}{t} \right]_1^A + \int_1^A \frac{F(t)}{t^2} dt$$

Or $F(A)/A \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 0$ et $t \mapsto F(t)/t^2$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ car F est bornée au voisinage de $+\infty$.

On en déduit donc par opérations la convergence de l'intégrale de $t \mapsto f(t)/t$ sur $[1, +\infty[$.

Exercice 89 : [énoncé]

Soit F une primitive de la fonction continue f sur $[0, +\infty[$. Formellement

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t^\alpha + 1} dt = \left[\frac{F(t)}{t^\alpha + 1} \right]_0^{+\infty} + \alpha \int_0^{+\infty} \frac{F(t)t^{\alpha-1}}{(t^\alpha + 1)^2} dt$$

Supposons la convergence de $\int_0^{+\infty} f(t) dt$. La primitive F est alors convergente en $+\infty$ et donc dans l'intégration par parties précédente, le crochet est convergent en $+\infty$.

De plus, la fonction F est bornée car continue sur $[0, +\infty[$ et convergente en $+\infty$. Par suite, quand $t \rightarrow +\infty$,

$$\frac{F(t)t^{\alpha-1}}{(t^\alpha + 1)^2} = O\left(\frac{1}{t^{\alpha+1}}\right)$$

et puisque $\alpha > 0$, on a la convergence de la deuxième intégrale dans la formule d'intégration par parties précédente.

Par le théorème d'intégration par parties, on peut affirmer que $\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{1+t^\alpha} dt$ converge.

Exercice 90 : [énoncé]

Quitte à considérer la nouvelle fonction $t \mapsto f(t)e^{-s_0 t}$, on peut supposer $s_0 = 0$.

Introduisons F une primitive de la fonction continue f sur $[0, +\infty[$.

La fonction F converge en $+\infty$ par hypothèse de convergence de l'intégrale.

La fonction F étant continue et de limite finie en l'infini, on montre aisément qu'elle est bornée sur \mathbb{R}^+ .

Par une intégration par parties,

$$\int_0^A f(t)e^{-st} dt = [F(t)e^{-st}]_0^A + s \int_0^A F(t)e^{-st} dt$$

Puisque la fonction F est bornée,

$$F(A)e^{-sA} \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 0$$

et $t \mapsto F(t)e^{-st}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car

$$F(t)e^{-st} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(1/t^2)$$

On en déduit que l'intégrale $\int_0^A f(t)e^{-st} dt$ admet une limite finie quand $A \rightarrow +\infty$, c'est-à-dire que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$ converge.

Exercice 91 : [énoncé]

Posons

$$G(x) = \int_a^x g(t) dt$$

Par intégration par parties

$$\int_a^x f(t)g(t) dt = [f(t)G(t)]_a^x - \int_a^x f'(t)G(t) dt$$

D'une part

$$[f(t)G(t)] = f(x)G(x) - f(a)G(a) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

car G est bornée et f de limite nulle en $+\infty$.

D'autre part, il y a convergence de l'intégrale $\int_a^{+\infty} f'(t)G(t) dt$. En effet

$$\int_a^x |f'(t)G(t)| dt = \int_a^x -f'(t)|G(t)| dt \leq \int_a^x -f'(t)M dt = (f(a) - f(x))M$$

Ainsi

$$\int_a^x |f'(t)G(t)| dt \leq f(a)M$$

Ses intégrales partielles étant majorées, il y a convergence de $\int_a^{+\infty} |f'(t)G(t)| dt$. Ainsi $f'G$ est intégrable sur $[a, +\infty[$. On peut alors conclure

$$\int_a^x f(t)g(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f'(t)G(t) dt$$

Exercice 92 : [énoncé]

a) Pour $a \leq 0$, l'intégrale n'est pas définie. Pour $a > 0$, $\frac{1}{t^{a+1}} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^a}$, par suite

$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{a+1}}$ n'est définie que pour $a > 1$. Finalement f est définie sur $]1, +\infty[$.

b) Si $1 < a \leq b$ alors

$$\forall t \geq 1, \frac{1}{t^{b+1}} \leq \frac{1}{t^{a+1}}$$

donc $f(b) \leq f(a)$. Ainsi f est décroissante.

$$0 \leq f(a) \leq \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a} = \frac{1}{1-a} \left[\frac{1}{t^{a-1}} \right]_1^{+\infty} = \frac{1}{a-1} \xrightarrow{a \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice 93 : [énoncé]

a) $t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} t^{x-1}$ et $t^{x-1}e^{-t} = O(1/t^2)$ la fonction $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est intégrable

sur $]0, +\infty[$ et par suite $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t} dt$ est bien définie pour $x > 0$.

b) Pour $x > 1$, les deux intégrales étant définies :

$$\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t} dt = [-t^{x-1}e^{-t}]_0^{+\infty} + (x-1) \int_0^{+\infty} t^{x-2}e^{-t} dt$$

Ainsi $\forall x > 1, \Gamma(x) = (x-1)\Gamma(x-1)$.

$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$. Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

Exercice 94 : [énoncé]

a) La fonction $t \mapsto \frac{t^{x-1}}{1+t}$ est définie et continue sur $]0, 1]$ et $\frac{t^{x-1}}{1+t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{t^{1-x}}$.

Par équivalence de fonctions positives, l'intégrale définissant $f(x)$ existe si, et seulement si, $x > 0$.

b) Pour $x \leq y$, on a

$$\forall t \in]0, 1], \frac{t^{x-1}}{1+t} \geq \frac{t^{y-1}}{1+t}$$

puis en intégrant $f(x) \geq f(y)$.

La fonction f est donc décroissante.

c) On a

$$f(x) + f(x+1) = \int_0^1 t^{x-1} dt = \frac{1}{x}$$

d) Puisque f est décroissante et positive, f converge en $+\infty$. Posons ℓ sa limite.

En passant à la limite la relation obtenue ci-dessus, on obtient $2\ell = 0$ donc $\ell = 0$.

Par décroissance

$$f(x) + f(x+1) \leq 2f(x) \leq f(x-1) + f(x)$$

donc

$$\frac{1}{x} \leq 2f(x) \leq \frac{1}{x-1}$$

On en déduit

$$f(x) \sim \frac{1}{2x}$$

d) c) Quand $x \rightarrow 0^+$,

$$0 \leq f(x+1) = \int_0^1 \frac{t^x}{1+t} dt \leq \int_0^1 t^x dt = \frac{1}{x+1} \leq 1$$

donc

$$f(x+1) \underset{x \rightarrow 0^+}{=} O(1) = o(1/x)$$

et par suite

$$f(x) = 1/x - f(x+1) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} 1/x \rightarrow +\infty$$

Exercice 95 : [énoncé]

a) Par intégration par parties,

$$\left| \int_0^A \varphi(t) \cos(xt) dt \right| \leq \frac{|\varphi(0)| + |\varphi(A)|}{x} + \frac{1}{x} \int_0^A |\varphi'(t)| dt$$

qui permet de conclure.

b) Pour $\varepsilon > 0$, il existe $A \in \mathbb{R}^+$ tel que

$$\int_A^{+\infty} |\varphi(t)| dt \leq \varepsilon$$

car φ est intégrable sur \mathbb{R}^+ . De plus, pour x assez grand,

$$\left| \int_0^A \varphi(t) \cos(xt) dt \right| \leq \varepsilon$$

donc

$$\left| \int_0^{+\infty} \varphi(t) \cos(xt) dt \right| \leq 2\varepsilon$$

ce qui permet de conclure.

Exercice 96 : [énoncé]

a) Quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-t}/t = O(e^{-t})$ donc $t \mapsto e^{-t}/t$ est intégrable sur tout $[x, +\infty[\subset]0, +\infty[$.

b)

$$F(x) = \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt - \int_1^x \frac{e^{-t}}{t} dt = F(1) - \int_1^x \frac{e^{-t}}{t} dt$$

est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^{+\ast}$ et $F'(x) = -\frac{e^{-x}}{x}$.

c) Quand $x \rightarrow +\infty$

$$0 \leq xF(x) = \int_x^{+\infty} \frac{xe^{-t}}{t} dt \leq \int_x^{+\infty} e^{-t} dt = \int_1^{+\infty} e^{-t} dt - \int_1^x e^{-t} dt \rightarrow 0$$

Quand $x \rightarrow 0$

$$xF(x) = x \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt = x \left(\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt + \int_x^1 \frac{e^{-t}}{t} dt \right)$$

donc

$$0 \leq xF(x) \leq x \left(F(1) + \int_x^1 \frac{1}{t} dt \right) \leq xF(1) + x \ln x \rightarrow 0$$

d) Par intégration par parties formelle

$$\int_0^{+\infty} F(x) dx = [xF(x)]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx$$

L'intégration par parties est justifiée par deux convergences et finalement

$$\int_0^{+\infty} F(t) dt = 1$$

Exercice 97 : [énoncé]

a) La fonction $t \mapsto \sin(t)/t$ est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$. On peut la prolonger par continuité en 0 en y posant la valeur 1. Par intégration par parties où l'on intègre l'expression $\sin t$ en $1 - \cos t$

$$\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \left[\frac{1 - \cos t}{t} \right]_0^x + \int_0^x \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, on a

$$\frac{1 - \cos x}{x} \rightarrow 0$$

et

$$\int_0^x \frac{1 - \cos t}{t^2} dt \rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$$

cette dernière intégrale étant convergente car la fonction peut être prolongée par continuité en 0 et est dominée par la fonction intégrable $t \mapsto 1/t^2$ en $+\infty$.

b) Soit F la primitive s'annulant en 0 du prolongement par continuité de $t \mapsto \sin(t)/t$. On a

$$f(x) = \lim_{+\infty} F - F(x)$$

Puisque la fonction F est de classe \mathcal{C}^1 , la fonction f est aussi de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} et

$$f'(x) = -F'(x) = -\frac{\sin x}{x}$$

c) Par intégration par parties,

$$\int_0^x f(t) dt = [tf(t)]_0^x - \int_0^x tf'(t) dt = xf(x) + \int_0^x \sin t dt$$

Or

$$\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \left[-\frac{\cos t}{t} \right]_x^{+\infty} - \int_x^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$$

donc

$$xf(x) = \cos x - x \int_x^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$$

puis

$$\int_0^x f(t) dt = 1 - x \int_x^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$$

Mais par intégration par parties on établit encore

$$\int_x^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt = \left[\frac{\sin t}{t^2} \right]_x^{+\infty} - 2 \int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t^3} dt$$

avec

$$\left| \int_x^{+\infty} 2 \frac{\sin t}{t^3} dt \right| \leq \int_x^{+\infty} \frac{2 dt}{t^3} = \frac{1}{x^2}$$

ce qui permet d'affirmer

$$x \int_x^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Finalement $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge et

$$\int_0^{+\infty} f(t) dt = 1$$

Exercice 98 : [énoncé]

a)

$$f : t \mapsto \frac{t}{\sqrt{t^3 - 1}} = \frac{t}{\sqrt{(t-1)(t^2 + t + 1)}}$$

est définie et continue sur $]1, x]$ et

$$f(t) \underset{1}{\sim} \frac{1}{\sqrt{3}\sqrt{t-1}}$$

donc $F(x)$ existe.

F est primitive de la fonction continue f sur $]1, +\infty[$ donc F est de classe \mathcal{C}^1 et $F'(x) = f(x)$.

Comme f est de classe \mathcal{C}^∞ , F est finalement de classe \mathcal{C}^∞ et sur $]1, +\infty[$

$$F'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^3 - 1}}$$

b) F est continue en 1 et $F'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty$. Tangente verticale en 1.

c) $\sqrt{t^3 - 1} \leq t^{3/2}$ donc

$$F(x) \geq \int_1^x \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2\sqrt{x} - 2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

donc $F(x) \xrightarrow{+\infty} +\infty$.

d) F est continue et strictement croissante sur $]1, +\infty[$ donc F réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

F réalise une bijection de classe \mathcal{C}^∞ de $]1, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$ avec $F'(x) \neq 0$ donc F^{-1} est de classe \mathcal{C}^∞ sur $]0, +\infty[$.

$$(F^{-1})' = \frac{1}{F' \circ F^{-1}} = \frac{\sqrt{(F^{-1})^3 - 1}}{F^{-1}}$$

donc F^{-1} est solution de l'équation différentielle considérée.

e) F^{-1} est continue en 0 et $F^{-1}(0) = 1$. En vertu de la relation

$$(F^{-1})' = \frac{\sqrt{(F^{-1})^3 - 1}}{F^{-1}}$$

on obtient

$$(F^{-1})'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

F^{-1} est donc dérivable en 0 et $(F^{-1})'(0) = 0$

Exercice 99 : [énoncé]

a) Soient $x, y > 0$.

La fonction

$$f : t \mapsto \frac{t - [t]}{t(t+x)}$$

est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[\supset]0, y]$ et quand $t \rightarrow 0$,

$$f(t) = \frac{t}{t(t+x)} = \frac{1}{t+x} \rightarrow \frac{1}{x}$$

donc f est prolongeable par continuité en 0.

Par suite l'intégrale définissant $G(x, y)$ existe bien.

b) Quand $t \rightarrow +\infty$,

$$f(t) = \frac{O(1)}{t(t+x)} = O\left(\frac{1}{t^2}\right)$$

donc f est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Par suite $G(x, y)$ converge quand $y \rightarrow +\infty$ vers

$$G(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t - [t]}{t(t+x)} dt$$

c) On remarque que

$$\frac{1}{t(t+n)} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+n} \right)$$

et on en déduit

$$G(n, y) = \frac{1}{n} \int_0^y \frac{t - [t]}{t} dt - \frac{t - [t]}{t+n} dt$$

Par linéarité de l'intégrale et changement de variable, on obtient

$$G(n, y) = \frac{1}{n} \left(\int_0^y \frac{t - [t]}{t} dt - \int_n^{y+n} \frac{t - [t]}{t} dt \right)$$

Enfin par la relation de Chasles

$$G(n, y) = \frac{1}{n} \left(\int_0^n \frac{t - [t]}{t} dt - \int_y^{y+n} \frac{t - [t]}{t} dt \right)$$

d) Puisque

$$0 \leq \int_y^{y+n} \frac{t - [t]}{t} dt \leq \frac{1}{y} \int_y^{y+n} t - [t] dt \leq \frac{n}{y}$$

on obtient quand $y \rightarrow +\infty$

$$G(n) = \frac{1}{n} \int_0^n \frac{t - [t]}{t} dt$$

et on a alors

$$H(n) = \int_0^n \frac{t - [t]}{t} dt$$

Par suite

$$H(n) - H(n-1) = \int_{n-1}^n \frac{t - [t]}{t} dt = \int_0^1 \frac{u}{u + (n-1)} du$$

puis

$$H(n) - H(n-1) = 1 - (n-1) \ln \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)$$

Par développement limité, on obtient

$$H(n) - H(n-1) = \frac{1}{2(n-1)} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

On en déduit que la série de terme général

$$H(n) - H(n-1) - \frac{1}{2n} = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Posons

$$S = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(H(n) - H(n-1) - \frac{1}{2n} \right)$$

On a

$$\sum_{k=1}^n \left(H(k) - H(k-1) - \frac{1}{2k} \right) = S + o(1)$$

donc

$$H(n) - H(1) - \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} = S + o(1)$$

Sachant

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$$

on obtient

$$H(n) \sim \frac{1}{2} \ln n$$

puis

$$G(n) \sim \frac{\ln n}{2n}$$

Exercice 100 : [énoncé]

L'intégrale étudiée est convergente puisque $t^2 e^{-t^2} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$.

Ecrivons

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \int_x^{+\infty} \frac{1}{t} \times t e^{-t^2} dt$$

Procédons à un intégration par parties avec $u(t) = -e^{-t^2}/2$ et $v(t) = 1/t$.

Les fonctions u et v sont de classe \mathcal{C}^1 et le produit uv converge en $+\infty$. On a donc

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{e^{-x^2}}{2x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt$$

Or

$$\frac{e^{-t^2}}{2t^2} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(e^{-t^2}\right)$$

donc, par intégration de relation de comparaison

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt = o\left(\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt\right)$$

et donc

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{-x^2}}{2x}$$

Exercice 101 : [énoncé]

L'intégrale étudiée est convergente puisque $t^2 e^{-t}/t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$.

Procédons à une intégration par parties avec $u(t) = -e^{-t}$ et $v(t) = 1/t$.

Les fonctions u et v sont de classe \mathcal{C}^1 et le produit uv converge en $+\infty$. On a donc

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt = \frac{e^{-x}}{x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt$$

Or

$$\frac{e^{-t}}{t^2} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{e^{-t}}{t}\right)$$

donc, par intégration de relation de comparaison

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt = o\left(\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt\right)$$

et donc

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{-x}}{x}$$

Exercice 102 : [énoncé]

Par intégration par parties

$$\int_1^x \frac{e^t}{t} dt = \left[\frac{e^t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{e^t}{t^2} dt$$

et en répétant celle-ci

$$\int_1^x \frac{e^t}{t} dt = \left[\frac{e^t}{t} + \frac{e^t}{t^2} \right]_1^x + \int_1^x 2 \frac{e^t}{t^3} dt$$

Or, toujours par intégration par parties

$$\int_1^x 2 \frac{e^t}{t^3} dt = \left[\frac{2e^t}{t^3} \right]_1^x + \int_1^x \frac{6e^t}{t^4} dt$$

Mais

$$\frac{e^t}{t^4} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{e^t}{t^3}\right) \text{ et } t \mapsto \frac{e^t}{t} \text{ est positive non intégrable sur } [1, +\infty[$$

donc, par intégration de relation de comparaison

$$\int_1^x \frac{e^t}{t^4} dt = o\left(\int_1^x \frac{e^t}{t^3} dt\right)$$

Ceci donne

$$\int_1^x 2 \frac{e^t}{t^3} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{2e^x}{x^3} - 2e + o\left(\int_1^x \frac{e^t}{t^3} dt\right) \sim \frac{2e^x}{x^3}$$

puis, dans le calcul initial

$$\int_1^x \frac{e^t}{t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{e^x}{x} + \frac{e^x}{x^2} + \frac{2e^x}{x^3} + o\left(\frac{2e^x}{x^3}\right)$$

en ayant intégré le terme constant dans le terme négligeable.

Exercice 103 : [\[énoncé\]](#)

Puisque f est continue en 0, on peut écrire

$$f(x) = f(0) + \varepsilon(x) \text{ avec } \varepsilon \xrightarrow{0} 0$$

On a alors

$$\int_{ax}^{bx} \frac{f(t)}{t} dt = \int_{ax}^{bx} \frac{f(0)}{t} dt + \int_{ax}^{bx} \frac{\varepsilon(t)}{t} dt$$

D'une part

$$\int_{ax}^{bx} \frac{f(0)}{t} dt = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

et d'autre part

$$\left| \int_{ax}^{bx} \frac{\varepsilon(t)}{t} dt \right| \leq \max_{t \in [ax, bx]} |\varepsilon(t)| \ln \frac{b}{a} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

On peut conclure

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{ax}^{bx} \frac{f(t)}{t} dt = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

Exercice 104 : [\[énoncé\]](#)

Par intégration par parties

$$\int_e^x \frac{dt}{\ln t} = \left[\frac{t}{\ln t} \right]_e^x + \int_e^x \frac{dt}{(\ln t)^2}$$

Or

$$\frac{1}{(\ln t)^2} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{\ln t}\right)$$

et la fonction $t \mapsto 1/\ln(t)$ est positive non intégrable sur $[e, +\infty[$. On a donc

$$\int_e^x \frac{dt}{(\ln t)^2} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\int_e^x \frac{dt}{\ln t}\right)$$

et on en déduit

$$\int_e^x \frac{dt}{\ln t} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{\ln x}$$

Exercice 105 : [\[énoncé\]](#)

a) On a

$$\frac{\ln(t+1)}{t} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln(t)}{t}$$

Puisque la fonction $t \mapsto \ln(t)/t$ est positive, non intégrable sur $[1, +\infty[$, on peut affirmer

$$\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt = \left[\frac{1}{2} (\ln t)^2 \right]_1^x = \frac{1}{2} (\ln x)^2$$

b) On a

$$\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt - \frac{1}{2} (\ln x)^2 = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} - \frac{\ln(t)}{t} dt = \int_1^x \frac{1}{t} \ln \left(1 + \frac{1}{t} \right) dt$$

et donc

$$\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + C + o(1)$$

avec la constante C égale à l'intégrale convergente

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} \ln \left(1 + \frac{1}{t} \right) dt$$

On peut montrer que cette constante vaut $\pi^2/12$ (via intégration terme à terme), mais c'est une autre histoire...

c) On fait

$$\varepsilon(x) = - \int_x^{+\infty} \frac{1}{t} \ln \left(1 + \frac{1}{t} \right) dt$$

On a

$$\frac{1}{t} \ln \left(1 + \frac{1}{t} \right) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$$

Puisque la fonction $t \mapsto 1/t^2$ est positive et intégrable sur $[1, +\infty[$, on peut affirmer

$$\varepsilon(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} - \int_x^{+\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{x}$$

Exercice 106 : [\[énoncé\]](#)

Puisque f est positive et non intégrable, on sait

$$\int_0^x f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $A \geq 0$ tel que

$$\forall x \geq A, |f'(x)| \leq \varepsilon |f(x)|$$

et alors

$$\forall x \geq A, f(x) = f(A) + \int_A^x f'(t) dt \leq f(A) + \varepsilon \int_0^x f(t) dt$$

Puisque $f(A)$ est une constante et $\int_0^x f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, il existe $A' \geq 0$ tel que

$$\forall x \geq A', f(A) \leq \varepsilon \int_0^x f(t) dt$$

Pour $x \geq \max(A, A')$, on obtient

$$0 \leq f(x) \leq 2\varepsilon \int_0^x f(t) dt$$

et on peut alors conclure.